



ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ¹ ของประเทศไทย

Characteristics and Properties of Established Soil Series
in the Northeast Region of Thailand

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
เอกสารวิชาการฉบับที่ 55/03/48

กรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน 2548

คำนำ

เอกสารวิชาการนี้ได้ปรับปรุงข้อมูลชุดเดิมต่างๆ จากเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งมีภาพหน้าตัดของชุดเดิมต่างๆ ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลชุดเดิมแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการในสาขาอื่นๆ และผู้สนใจให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเดิมได้ง่ายขึ้น และสามารถนำเอกสารข้อมูลเดิมไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่เฉพาะนักวิชาการทางปฐพีวิทยาเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเอกสารนี้จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลมากนัก เพื่อไม่ให้อ่านสับสนจนเกินไป หากมีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ควรศึกษาจากเอกสารวิชาการของส่วนมาตรฐาน การสำรวจจำแนกเดิมและที่เดินที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรึกษานักสำรวจเดิมของส่วนมาตรฐานการสำรวจ จำแนกเดิมและที่เดิน

หากพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้แก้ไขเอกสารให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณนักสำรวจเดิมของส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกเดิมและที่เดิน ส่วนสำรวจจำแนกเดิม ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ และคณะทำงานวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักสำรวจเดิมและวางแผนการใช้ที่ดิน ที่ร่วมกันดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น ติชมและเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงเอกสารนี้ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา

(นายชุมพล ลิลิตธารوم)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจเดิมและวางแผนการใช้ที่ดิน

สารบัญ

หน้า

บทนำ	1
วัตถุประสงค์	2
อุปกรณ์และวิธีการ	2
ผลการศึกษา	2
สรุป	47
เอกสารอ้างอิง	48
ภาคผนวก	49

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางผนวกที่

1. สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	50
2. สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย	52
3. สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย	54
4. สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย	55
5. การจำแนกดินที่จัดตั้งรวมทุกภาคของประเทศไทยตามระบบอนุกรรมวิธานปี ค.ศ. 2003	57

สารบัญชุดคิน

	หน้า
1. ชุดคินบอร์บี (Borabue series: Bb)	3
2. ชุดคินบ้านไผ่ (Ban Phai series: Bpi)	4
3. ชุดคินบุรีรัมย์ (Buri Ram series: Br)	5
4. ชุดคินบุณฑริก (Buntharik series: Bt)	6
5. ชุดคินโชคชัย (Chok Chai series: Ci)	7
6. ชุดคินจักราช (Chakkarat series: Ckr)	8
7. ชุดคินชุมพวง (Chum Phuang series: Cpg)	9
8. ชุดคินชุมพลบุรี (Chumphon Buri: Cph)	10
9. ชุดคินจัตตุรัส (Chatturat series: Ct)	11
10. ชุดคินจันทึก (Chan Thuek series: Cu)	12
11. ชุดคินด่านขุนทด (Dan Khun Thot series: Dkt)	13
12. ชุดคินห้วยแตลง (Huai Thalaeng series: Ht)	14
13. ชุดคินคำบาง (Khambong series: Kg)	15
14. ชุดคินกุลาร้องไห (Kula Ronghai series: Ki)	16
15. ชุดคินเขมราฐ (Khemarat series: Kmr)	17
16. ชุดคินโคราช (Khorat series: Kt)	18
17. ชุดคินเลย (Loei series: Lo)	19
18. ชุดคินมหาสารคาม (Maha Sarakham series: Msk)	20
19. ชุดคินนำพอง (Nam Phong series: Ng)	21
20. ชุดคินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn)	22
21. ชุดคินอั่น (On series: On)	23
22. ชุดคินปากช่อง (Pak Chong series: Pc)	24
23. ชุดคินพิมาย (Phimai series: Pm)	25
24. ชุดคินเพญ (Phen series: Pn)	26
25. ชุดคินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)	27
26. ชุดคินร้อยเอ็ด (Roi Et series: Re)	28

สารบัญชุดคิน (ต่อ)

	หน้า
27. ชุดคินเรนู (Renu series: Rn)	29
28. ชุดคินสีคิว (Sikhio series: Si)	30
29. ชุดคินสกอล (Sakon series: Sk)	31
30. ชุดคินสระแก้ว (Sa Kaeo series: Ska)	32
31. ชุดคินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn)	33
32. ชุดคินศรีสังคราม (Si Songkhram series: Ss)	34
33. ชุดคินสีทน (Si Thon series: St)	35
34. ชุดคินสุรินทร์ (Surin series: Su)	36
35. ชุดคินสตีก (Satuek series:Suk)	37
36. ชุดคินธาตุพนม (That Phanom: Tp)	38
37. ชุดคินทุ่งสมฤทธิ์ (Thung Samrit series: Tsr)	39
38. ชุดคินท่าตูม (Tha Tum series: Tt)	40
39. ชุดคินท่าอุเทน (Tha Uthen series: Tu)	41
40. ชุดคินอุบล (Ubon series: Ub)	42
41. ชุดคินอุดร (Udon series: Ud)	43
42. ชุดคิน瓦ริน (Warin series: Wn)	44
43. ชุดคินย่างตลาด (Yang Talat series: Yl)	45
44. ชุดคินยะโสธร (Yasothon series: Yt)	46

ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Characteristics and Properties of Established Soil Series in the Northeast Region of Thailand)

1. บทนำ

ชุดดิน (soil series) เป็นหน่วยจำแนกเดียวกันระดับต่ำสุดในระบบการจำแนกอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยได้นำมาใช้ในการจำแนกเดียวกันนี้ แต่ปี พ.ศ. 2518 แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการตั้งชื่อชุดดินตามระบบที่นำมาใช้ในประเทศไทยในช่วงแรก แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงและกำหนดลักษณะของชุดดินต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบอนุกรมวิธานดิน

ในการตั้งชุดดินแต่ละชุดดิน จะต้องมีการศึกษาลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี และจุลสัณฐาน และกำหนดช่วงของลักษณะและสมบัติของแต่ละชุดดินไว้ เพื่อสามารถอธิบายถึงความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันของชุดดินต่างๆ ได้ นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดดินยังอธิบายถึงการกำเนิดและสภาพแวดล้อมของดินด้วย ดังนั้นข้อมูลชุดดินจึงถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานหรือสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเกษตร การป่าไม้ การชลประทาน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การประมง การปฏิรูปที่ดิน การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน การประเมินภาษีที่ดิน เป็นต้น

โดยปกติการตั้งชื่อชุดดินจะใช้ชื่อของสถานที่ที่พัฒนาขึ้น เป็นครั้งแรกมาตั้งเป็นชื่อของชุดดินเพื่อให้จดจำได้ง่าย อาจเป็นชื่อของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ดินที่จะถูกตั้งชื่อพร้อมทั้งกำหนดช่วงลักษณะและสมบัติประจำของชุดดินนั้น จะต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 8 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,000 ไร่ (เดิมกำหนดไว้ 20 ตารางกิโลเมตร)

อย่างไรก็ตาม ชื่อชุดดินพร้อมคำอธิบายต่างๆ เป็นลักษณะในเชิงวิชาการ ทำให้เป็นข้อจำกัดในการนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชุดดินไปใช้ให้เป็นที่เพร่หลาย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหมายข้อมูลในเชิงวิชาการให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เอกสารฉบับนี้จึงได้วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดินให้ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ตามอาจจะยังคงรูปแบบทางวิชาการโดยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้บ้าง เนื่องจากบางครั้งการแปลเป็นภาษาไทยอาจไม่สมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดทำข้อมูลชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
- 2.2 ปรับปรุงการจำแนกดินและคำอธิบายดินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ. 2003
- 2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงและบำรุงดินที่เหมาะสมสำหรับชุดดินนั้นๆ

3. อุปกรณ์และวิธีการ

3.1 อุปกรณ์


1. เอกสารวิชาการฉบับที่ 522 เรื่องการทำหลักฐานของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (กิติ อนุกูล และวนิชช์สุรี, 2547)
2. ผลวิเคราะห์ดินของชุดดินต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. ฐานภาพหน้าตัดของชุดดินต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4. Keys to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) ซึ่งเป็นคู่มือการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ. 2003
5. แผนที่ดินและแผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

3.2 วิธีการ

1. แปลข้อมูลชุดดินเป็นภาษาไทย โดยยึดถือเอกสารวิชาการฉบับที่ 522 เป็นต้นแบบ
2. ปรับปรุงข้อมูลชุดดินให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน แผนที่ดินและแผนที่กลุ่มชุดดินประกอบในการพิจารณา
3. ออกตราสอปสภพพื้นที่และลักษณะของชุดดินบางชุดดินที่ไม่ข้อมูลไม่แน่นชัดในสนำม
4. แปลความหมายข้อมูลดินและวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูก และเสนอแนวทางในการแก้ไข
5. จัดทำเอกสารตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมทั้งภาพหน้าตัดชุดดิน

4. ผลการศึกษา

ข้อมูลชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทยจำนวน 44 ชุดดิน ได้รับการปรับปรุงและแปลความหมาย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชดังนี้



กลุ่มชุดดินที่	49
การจำแนกดิน	Loamy over loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaqueic Haplustults
การทำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับดินอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด พับบนพื้นผิวของการเคลื่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลางและค่อนข้างเลวในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	เร็วสีปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	เร็วในดินบนและช้าในดินล่าง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ปาเต็งรัง ญูลิปตัล และมันสำปะหลัง
การแพร่กระจาย	พปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-E-Btcv-2C
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกปานกลางก้อนกรวด ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนก้อนกรวด สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาปนน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลแก่และพบร่องรอย อ่อน (plinthite) ภายในความลึก 75 ซม. พับพากรลูกรังและเศษหินทรายที่กำลังสลายตัวในระดับความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินเขมราฐ

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนเป็นทราย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดิน

2 ชุดดินบ้านไผ่ (Ban Phai Series: Bpi)



กลุ่มชุดดินที่	41
การจำแนกดิน	loamy, siliceous, isohyperthermic Arenic Paleustalfs
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหิน bazalt มีผิวข่องกาражะลักษณะคล้ายผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกรากลื่นล่อนลาดเล็กน้อยถึงลูกรากลื่นล่อนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	เร็วในดินบนและช้าในดินล่าง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	เร็วถึงปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ปลูกพืชไร่และไม้ผล
การแพร่กระจาย	พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Ap-E-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ำตาลอ่อน ถัดลงไปเป็นดินทรายปนดินร่วน สีเทาปนชมพู ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลแก่หรือน้ำตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอคอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกันชุดดิน

ชุดดินมหาสารคาม

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ปลูกพืชทนแล้ง เช่น

ข้อเสนอแนะสำหรับหลัง

๓ ชุดดินบุรีรัมย์ (Buri Ram series: Br)



กลุ่มชุดดินที่	1
การจำแนกดิน	Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts
การกำเนิด	เกิดจากการสลายตัวหินอุกค์กับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต์ พบรูปส่วนตัวของลavaหลาภ
สภาพพื้นที่	ราบเรียบลึกลงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ช้าถึงช้ามาก
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเต็งรัง ปัจจุบันใช้ทำนา
การแพร่กระจาย	พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Apg-Bssg-Bss
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเนื้อยาตราลด สีดินเป็นสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาล ปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ในตุ่นแล้งจะมีรอยแตกระหว่างแผลลึกและมีรอยไถล ในหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 6.0-7.0$) ในดินบนและเป็นกลางถึง เป็นด่างปานกลาง ($\text{pH } 7.0-8.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
25-50	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	สูง	สูง	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน	ชุดดินวัฒนา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์	เป็นดินเนื้อยาจัด
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์	ทำนา ควรไถพรวนในช่วงที่ดินอุ่นในสภาพความชื้นที่เหมาะสม ควรปรับปรุงดินโดย การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยกอเพื่อทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและปุ๋ยเคมี

4 ชุดดินบุญทริก (Bunthrik series: Bt)



กลุ่มชุดดินที่	17hi or 35b
การจำแนกดิน	Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Plinthaqueic Paleustults
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหายาบชามาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงลูกคลื่นลดลงลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลางในดินบนและค่อนข้างเลวในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลางถึงช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ไม้พุ่ม灌木 และป่าแดง บางส่วนใช้ทำนา
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดเรียงชั้น	A-Bw-Bt-2Btgv
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนเทา ถัดลงไปมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาลถึงสีเทาปนน้ำตาล พบรดปะสีแดงของศिलาแดงอ่อนและพบชั้นดินที่แสดงถึงความไม่ต่อเนื่องทางธรณี ในระดับความลึก 100-150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินเรนจู

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชอาจขาดน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูก ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ทำนา ควรปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ควรจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ

5 ชุดดินโซคชัย (Chok Chai series: Ci)



กลุ่มชุดดินที่ 29

การจำแนกดิน Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox

การกำเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เศษหินเขิงเข้าของหิน bazaltic พบบนพื้นผิวเหลือจากการกร่อนซอยแบ่ง

สภาพพื้นที่ ลูกลื่น loosenada ลักษณะน้ำดี ลูกคลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-12 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกตัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล

การแพร่กระจาย ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายเป็นหลังหรือดินเหนียว สันตากปนแดงเข้มมาก ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงม่วงหรือสีแดงม่วงเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปนกําลังถึงเป็นกรด ($\text{pH } 6.0-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ($\text{pH } 4.5-5.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความจุแลกเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินปากช่อง

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พืชอาจขาดน้ำในช่วงฤดูเดパートลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล ควรจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ของการเพาะปลูกให้เพียงพอ โดยการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เมื่อพืชต้องการ ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นแก่พืช เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น

6 ชุดดินชุมพวง (Chum Phuang series: Cpg)



กลุ่มชุดดินที่	40
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults
การทำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับดินบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกรดล่อนลาดเล็กน้อยถึงลูกรดล่อนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างมาก
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	เร็ว
พิษพรมธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ปาเตี๊ยะ ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปอ ฝ้าย และไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-(E)-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วนสีน้ำตาลปนแดง ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเนื้อยางปนทรายในดินล่างตอนล่าง สีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 5.5-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินยโสธร

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ค่อนข้างเป็นทราย อาจขาดน้ำในช่วงของฤดูการเพาะปลูกทำให้เกิดการชะงักงันของการเจริญเติบโตของพืช

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรมีการจัดการดินที่ดีและปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก ใส่เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ที่พืชต้องการให้แก่ดิน ทำให้สมบูรณ์ทางกายภาพของดินดีขึ้น จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้พอเพียง

7

ชุดดินชุมพลบุรี (Chumphon Buri series: Chp)



กลุ่มชุดดินที่	38
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนสันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไม้พุ่ม灌木 ปลูกพืชผักสวนครัว
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-Bw-2C
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นพอกดินร่วนถึงดินทรายปนดินร่วน แล้วแต่ ตะกอนที่น้ำพามาทับถมในแต่ละปี โดยแต่ละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน มีสีน้ำตาล น้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลซีด จะพบจุดประสาน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความจุแลกเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินเชียงใหม่

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลากรา

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ง เพราะไก่แล่งน้ำ

ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีการเสียหายจากน้ำท่วมได้

8 ชุดดินจักราช (Chakkarat Series: Ckr)



กลุ่มชุดดินที่	40
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, mixed subactive isohyperthermic Oxyaquic Paleustults
การกำเนิดดิน	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหายาบชะมาทับบนพื้นผิวของการเคลื่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงลูกคลื่น loosenadae เล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ปาเต็งรัง ปลูกปอ ฝ้าย แตงโม และมันสำปะหลัง
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-(E)-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินร่วนหนี่ยวปนทรายในตอนล่าง มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง จะพบจุดประสีน้ำตาลแก่หรือແಡງปนเหลืองตลอดหน้าดิน ปฏิกิริยาดินเป็นการจัดถึงเป็นการเด็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นการจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินหัวยแอล
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชไว้ แต่ควรระวังการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการขาดน้ำและการชะล้างพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแต่น้อยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เป็นตัวอย่างที่ควรจะกระทำ การจัดหาแหล่งน้ำโดยการขุดสร้าง ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินและเพิ่มสมบัติทางกายภาพของดิน

9

ชุดดินจตุรัส (Chatturat series: Ct)



กลุ่มชุดดินที่ 55

การจำแนกดิน Fine, mixed, active isohyperthermic Typic Haplustalfs

การกำเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีเนื้อคุณปน เช่น หินดินดานและหินทรายแบ่งที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบสูง

สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบรื่นบดถึงลูกคลื่นลดลงลดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ซึ่งปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พิษพรมธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง กัลวย ข้าวโพดหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง

การจัดเรียงชั้น A-Bt-Cr

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแบ่ง สีน้ำตาลปนแดง ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแบ่ง สีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดง ในช่วงความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินผุ ถัดจากชั้นหินผุเป็นชั้นหินแข็งซึ่งเป็นหินพื้น ภูเก็ตดินเป็นกรวดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง ($\text{pH } 6.5-8.0$) ในดินบนและเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ($\text{pH } 6.0-8.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	สูง	สูง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
25-50	ต่ำ	สูง	สูง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินวังสะพุง

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี ดินค่อนข้างแห้งแห่นทึบ โครงสร้างไม่เหมาะสม น้ำซึมผ่านได้ช้า อาจขาดแคลนน้ำได้ในช่วงฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ควรปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการไถพรวนที่เหมาะสม เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่พบรดินนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตแห้งแล้ง ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาและชนิดของพืชที่ปลูก ควรทำอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ำ ปลูกพืชฤดูดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกพืชบำรุงดินและปลูกพืชหมุนเวียน



กลุ่มชุดดินที่ 44

การจำแนกดิน Sandy, siliceous, isohyperthermic, coated Typic Ustipsamments

การกำเนิด เกิดจากการสลายตัวญี่ปุ่นกับที่ของหินแกรนิต บนบริเวณพื้นผิวเหลือจาก การกร่อนซอยแบ่ง

สภาพพื้นที่ ลูกลื่น loosenada เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างมาก

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ปาเต็งรัง ทุ่งหญ้า บางแห่งนำไปใช้เป็นวัสดุสร้างทาง

การแพร่กระจาย ภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนตลอด อาจพบก้อนกรวดปะปน ในดินล่าง ดินบนเป็นสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นสีเทาปนชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อน กรวดที่พบเป็นแร่ ควอตซ์และเฟลเดอร์สปาร์ อาจพบจุดประสีในชั้นหินดันกำเนิดที่กำลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 6.0-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินด้านขุนทด

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นทราย โครงสร้างของดินเลว

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรจะลงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติ ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในด้านการเกษตร ควรจัดหน้าแหล่งน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูพากและควรรีบปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุแก่พืชและทำให้สมบัติของดินดีขึ้น

11 ชุดดินด่านขุนทด (Dan Khun Thot series: Dk)



กลุ่มชุดดินที่ 44

การจำแนกดิน Sandy, siliceous, coated, isohyperthermic, Ustic Quartzipsamments

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกรากลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกรากลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-12 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างมาก

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน เร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ปาเต็งรัง ทำไร้มันสำปะหลัง ปอ ข้ออย

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทรายตลอด สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างมีสีน้ำตาล น้ำตาลชี้ดหรือน้ำตาลปนเทา พบรดูประสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีเหลืองลึกกว่า 100 ซม. มีก้อนเหล็กແ מגกานีสสะสมในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 4.5-6.5$) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแกเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินจันทึก

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

เนื้อดินเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกพืชไว้ ควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการขาดน้ำและการชะล้างพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การจัดน้ำแหล่งน้ำโดยการขุดสร้าง ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน

12 ชุดดินห้วยแตลง (Huai Thalaeng series: Ht)



กลุ่มชุดดินที่	40
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, mixed semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบซะมาทับบนพื้นผิวของการเคลื่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่น loosenada เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหล่ข่องน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	เร็ว
พิชพวรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเต็งรัง ข้อย มันสำปะหลัง ที่อยู่อาศัย
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-(E)-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล ปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกไป มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง พบรดูประสีที่ความลึกมากกว่า 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัสที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืชในฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชไว้ แต่ควรระวังการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการขาดน้ำและการซ้ำล้างพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การจัดทำแหล่งน้ำโดยการขุดสร้าง ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน

ชุดดินจัดราษฎร์

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืช

13 ชุดดินคำบาง (Khambong series: Kg)



กลุ่มชุดดินที่ 41

การจำแนกดิน Sandy, siliceous, isohyperthermic Typic Haplustalfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลดลงลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %

การระบายน้ำ ดีปานกลาง

การเหลบฯของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกแห้งแล้งและใช้ปลูกพืชไว้ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปอ ถั่วต่างๆ และอ้อย

การแพร่กระจาย พပนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-E-Bt-C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วนและเปลี่ยนเป็นดินร่วนเนินiyปนทรายในดินล่างลึกลงไป มีสีน้ำตาลซึ่งเป็นชั้นสะสมอนุภาคดินเนินiyและอาจพบจุดประสีในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินด่านวนhood

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ ดินเป็นทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะล้างได้ง่าย เสี่ยงต่อความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไว้ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์พอกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยจะช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำไว้ได้ดีขึ้น สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำได้ง่าย นอกจากนี้แล้วควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น

14 ชุดดินกุลาธ่องไห (Kula Ronghai series: Ki)



กลุ่มชุดดินที่ 20

การจำแนกดิน Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Natraqualfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินอยู่บ่นที่รากตะกอนน้ำพาน้ำ

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-2 %

การระบายน้ำ เลว

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลางถึงช้า

พิษพรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา บางแห่งถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นที่กร้างว่างเปล่า
เนื่องจากเป็นดินเค็มจัด

การแพร่กระจาย พบมากบริเวณต่อต้าน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Apg-Btgn-Cg

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนเทา ดินล่าง
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนเนียนปนทราย สีเทาหรือสีเทาปนชมพู ซึ่งเป็นชั้นสะสมประจุโซเดียมที่
แตกเปลี่ยนได้ มักพบจุดประสีน้ำตาล สีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ใน
ดุกแล้งจะมีคราบเกลือ löy หนาที่ผิวดิน ในดินล่างลึกกว่า 1 เมตรลงไป เป็นดินร่วน สีเทาหรือสีเทา
ปนเขียวหรืออาจพบดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีเทาปนชมพูหรือสีน้ำตาลอ่อน (ชั้น 2C) ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ในดินบนและเป็นต่ำงเล็กน้อยถึงเป็นต่ำงจัด (pH 7.5-8.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
25-50	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินอุดร

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

เป็นดินเค็มต่ำ ไม่เกลือโซเดียมสูงซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช มีโครงสร้างไม่

เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ปรับปรุงดินโดยใช้อินทรีย์ตุและไส้ยีปชัม ปลูกพืชทนเค็ม และสร้างแหล่งน้ำ

สำรองไว้ใช้ในยามที่ฝนทิ้งช่วง

15 ชุดดินเขมราฐ (Khemarat series: Kmr)



กลุ่มชุดดินที่ 17hid3c

การจำแนกดิน Fine-loamy over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Plinthaqueic Haplustults

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบะน้ำทับถมอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด
พบบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกลดล่อนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %

การระบายน้ำ ดีปานกลางในดินบนและค่อนข้างเลวในดินล่าง

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกแห้ง逵ทางและใช้
ปลูกข้าว

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Btv-2Btgv-2C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล
หรือสีน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อน และเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแบ่ง สีเทาปนซมพูหรือสีเทาในดินล่างลึกลงไป ช่วงเปลี่ยนระหว่างดินร่วน
เหนียวปนทรายเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแบ่งจะเปลี่ยนโดยทันที ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน มักพบจุด
ประสีแดงและศิลาแดงอ่อนภายใน 150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินผุและหินพื้น (weathering siltstone และ siltstone) ที่
ระหว่างความลึก 100-150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.0\text{-}6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก
($\text{pH } 4.5\text{-}5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตกตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟลักฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินบุณฑริก

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสื่อมต่อการขาดแคลนน้ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ยคอก น้ำยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรจัดหา
แหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก

16 ชุดดินโคราซ (Korat series: Kt)



กลุ่มชุดดินที่	35
การจำแนกดิน	Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Oxyaquic) Kandiustults
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหินขาวซึ่งมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่น loosenada เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ปาเต็งรังหรือปาเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และถั่วต่างๆ
การแพร่กระจาย	พบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่มีอนุภาคดินเหนียวไม่เกิน 35 % สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน้ำตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดินล่างลึกลงไป พบรดูประสีน้ำตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึกมากกว่า 100 ซม. จากผิวดิน อาจพบก้อนเหล็กสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มน้ำแบบ	ฟองฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินสติก
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชไร่ แต่ควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการขาดน้ำและการชะล้างพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแท่น้อยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เป็นตัวอย่างที่ควรจะกระทำ การจัดนาแหล่งน้ำโดยการขุดสระ ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น



กลุ่มชุดดินที่ 31

การจำแนกดิน Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Eutrustox

การกำเนิด เกิดจากการถลایตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เชษหินเชิงเข้าของหินแกรนิต

สภาพพื้นที่ ลูกรุกลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกรุกลื่น loosenada มีความลาดชัน 4-8 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน เร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ป่าลูกพีชไวร์

การแพร่กระจาย ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนแดง สีน้ำตาลปนแดงเข้มและสีแดง ในดินล่างลึกลงไป อาจพบก้อนเหล็กและเมงกานีสสะสมในดินล่างนี้ ระบบอนุภาคพากคาวอตซ์ที่เป็นก้อนเหลี่ยมตลอดทุกชั้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 6.0-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินหน่องมด และชุดดินเขียงแสน

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

พืชอาจขาดแคลนน้ำสำนั่งทึ่งช่วง

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ปลูกพีชไวร์หรือไม้ยืนต้น จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับพืช ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น

18 ชุดดินมหาสารคาม (Maha Sarakham series: Msk)



กลุ่มชุดดินที่	41
การจำแนกดิน	Loamy, siliceous, subactive isohyperthermic Oxyaquic Arenic Haplustalfs
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบะซะมาทับตามบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคัลล่อนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน้ำ	ดีปานกลาง
การไหล่บ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พิษพรมธรรมชาติและการใช้ประযุชน์ที่ดิน	ป่าเต็งรัง มันสำปะหลัง อ้อยและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Ap-E-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลปนแดงและมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเนียนยวานทรายในระหว่างความลึก 50-100 ซม. และพบจุดประสีน้ำตาลแก่ หรือสีเหลืองปนแดงภายใต้ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.0-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 4.5-6.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความ茱แลกเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประยุชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประยุชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินป่าไม้ และชุดดินน้ำพอง
ข้อจำกัดในการใช้ประยุชน์ ดินเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พืชมักแสดงอาการขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจน ในช่วงฝนแห้งแล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประยุชน์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ปลูกพืชทนแห้ง เช่น อ้อย มันสำปะหลัง

19 ชุดดินน้ำพอง (Nam Phong series: Ng)



กลุ่มชุดดินที่ 44

การจำแนกดิน Loamy, siliceous, isohyperthermic Grossarenic Haplustalfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหินขาวซึ่งมาทับกมบันพื้นผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกรากลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกรากลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-10 %

การระบายน้ำ ดีถึงค่อนข้างมาก

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน เร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปาเต็งรัง มันสำปะหลัง อ้อย และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-E-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ำตาลปนเทา
หรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีเข้มพู สีน้ำตาลซีดมาก พบร่องรอยที่ความลึก
ต่ำกว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ำตาลซีด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายในดินล่างลึกลงไป พบร่องรอยที่ความลึกต่ำกว่า 100 ซม. จากระดับผิวดิน พบว่าดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนปนทรายในดินล่าง

ล่างนี้ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5-
6.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ต่ำๆ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินบ้านไผ่ และชุดดินมหาสารคาม

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

ดินเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พืชมักแสดงอาการขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัดเจน
ในช่วงฝนแล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลาย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไป จัดว่าไม่ค่อยเหมาะสมในการที่จะนำมาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ถ้าจำเป็นต้อง
นำมาใช้จะต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและพืชที่จะปลูก แต่อย่างไรก็ตามอาจทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือ
ปลูกไม้เชื้อสายประเทศไทยที่เติบโตและทนแล้งได้ดี



กลุ่มชุดดินที่ 6

การจำแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquults

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับตามอยู่บ่นที่รากตะกอนน้ำพาน

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-1 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างเลว

การเหลบฯของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Btgv

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเนียนปูนทรายแบ่งหรือดินร่วนปูนดินเนียนยา สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาล มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินเนียนปูนทรายแบ่งหรือดินเนียนยา สีเทาอ่อน สีน้ำตาลปนเทาจางหรือสีเทา มีจุดประสีแดงของศิลาและอ่อนในดินล่างประมาณ 5-50 % โดยประมาณ ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดิน

บนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชื้นแตกเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเขียวราย

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช เพิ่มสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยพืชสด

21 ชุดดินอ่อน (On series: On)



กลุ่มชุดดินที่ 25

การจำแนกดิน Loamy-skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Epiaquults [Petroferric Epiaquults]

การกำเนิด เกิดจากตะกอนซะมาทับถมอยู่บนส่วนตื้นของพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างเลวถึงเลว

การไหล่บ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ใช้ทำนาดำเนิน

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Btcg-(Bsm)-Cgv

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนก้อนกรวดมาก สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู จะพบชั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันค่อนข้างแน่นหรืออาจเป็นแผ่นแข็งภายในความลึก 50 ซม. จาก ผิวดิน ให้ขึ้นนิ่งไปจะพบร่องหนีวยาวหรือดินหนีวยวนทราย สีขาวหรือสีเทาอ่อน พบรากสีแดง สีเหลืองหรือสีน้ำตาลตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ($\text{pH } 5.5-6.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง


ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตถุ	ความชุ่มแลกเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเพ็ญ

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีชั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันค่อนข้างแน่น พบรากใน 50 ซม. จากผิวดิน ทำให้ขาดช่วงการเจริญเติบโตของรากรพืช

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก บุ่มหมัก และปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น

22 ชุดดินปากซ่อง (Pak Chong series: Pc)



กลุ่มชุดดินที่ 29

การจำแนกดิน	Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox
การกำนิด	เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เศษหินเขิงเข้าของหินดินดานที่แทรกกับหินปูนในสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่นлонลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พิษพรondenธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วต่างๆ
การแพร่กระจาย	ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนี่ยวปนทรายแบ่ง สีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนแดงเข้ม สีแดง อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินบ้านจ่อง

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อทำให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มเวρือตุที่มีประโยชน์ให้แก่พืช

23 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm)



กลุ่มชุดดินที่ 4

การจำแนกดิน Very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับตบมอยู่บนที่ราบน้ำท่วมถึง

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชันน้อยกว่า 1 %

การระบายน้ำ เลว

การหลบซ่อนน้ำในผืนดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา

การแพร่กระจาย ที่ราบลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง

การจัดเรียงชั้น Apg-Bssg

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเนื้ีย瓦ตลอด หน้าดินมีสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาอ่อน มักพบจุดประสีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลือง น้ำตาลปนแดงหรือแดงปนเหลืองตลอดหน้าดิน ถูกเลี้ยงหน้าดินจะแตกกระแหงกว้างและลึกพบรอยไอลชัดเจน และอาจพบก้อนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแลกเปลี่ยน เคต์ไออ่อน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินสิงห์บุรี และชุดดินครีสคราม

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

เป็นดินเนื้ีย瓦จัด สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี มีน้ำท่วมชั่งในฤดูฝน

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำนา ควรไถพรวนในช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น ถ้ามีโครงการชลประทานที่สมบูรณ์แบบ จะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 ชุดดินเพญ (Phen series: Pn)




กลุ่มชุดดินที่	25
การจำแนกดิน	Loamy-skeletal mixed subactive, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquults
การทำนิ德	เกิดจากตะกอนซะมาทับบนหินตะกอนเนื้อละเอียดพบในส่วนต่ำของพื้นผิวของ การเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ	เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลางในดินบนและช้าในดินล่าง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา	
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Apg-Btg-Btcgv-BCgv
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาล ปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลือง และ/หรือ สีแดงปนเหลือง ส่วนดินล่างภายใน 50 ซม. มักเป็นดินร่วนเนียนยานปนทรายปนกรวดมากในดินล่างตอนบนและเป็นดินเนียนยวainในดินล่าง ปริมาณลูกรังจะลดลงตามความลึก สีของดินล่างตอนบนจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดินล่างเป็นสีเทาและพบจุดประสีน้ำตาลแดง ปนเหลืองและแดงตลอดหน้าดิน ศิลาแดงอ่อนมีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายใน 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแลกเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน	ชุดดินขี้น
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์	เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำนา ควรใส่ปุ๋ยคอก บุ่ยหมักและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควร จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก	

25 ชุดดินพอนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)



กลุ่มชุดดินที่ 49

การจำแนกดิน Loamy-skeletal over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults

การทำนิด เกิดจากตะกอนซะมาทับดินบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพื้นผิวของกราบลี่ย์ผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงลูกคิลล่อนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %

การระบายน้ำ ดีปานกลาง

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลางในดินบนและข้าในดินล่าง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ปาเต็งรัง พืชไร่ บางพื้นที่ทำคันนาปลูกข้าว

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A(Ap)-Btcv-BC

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่ ส่วนดินล่างกว้างใน 50-100 ซม. เป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดมากหรือดินเหนียวปนกรวดมากถัดไปจะเป็นชั้นดินเหนียวตลอด มีสีเทาปนน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงของศิลปะลงอยู่บนและน้ำตาลแก่หรือน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแลกเปลี่ยน เคตไออ่อน	ความชื้นด้วยเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินสรวงแก้ว

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรณีที่ใช้ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชที่มีรากสั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว

และอื่นๆ ส่วนกรณีที่ใช้ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 75x75x75 ซม. และวนหน้าดินหรือดินจากที่อื่นมาผสมกับปูยอินทรีย์ ใส่ลงในหลุมปลูก อัตราประมาณ 20-30 กก.ต่อหลุม เมื่อผสมแล้วนำกลับลงไปในหลุม ก่อนที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น

26 ชุดดินร้อยเอ็ด (Roi-et series: Re)



กลุ่มชุดดินที่ 17

การจำแนกดิน Fine-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Kandiaquults

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหายาบชະมาทับบนพื้นผิวของการเคลื่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-2 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างเลว

การเหลบฯของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลางถึงช้า

พิชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำนา ปลูกพืชไร่หรือพืชผักในฤดูแล้ง

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Apg-Btg

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทรายอาจพบชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ำตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบรดูประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน แต่ตลอดดินเป็นกรดเจือกน้ำ (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเจือกน้ำ (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง

เป็นกรดเจือกน้ำ (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินเรณู

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ เสี่ยงต่อการขาดน้ำในฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ หากใช้ทำนาควรมีการฉลบระหว่างเข้าช่วงและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ถ้าปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสียของน้ำจากการขาดแคลนน้ำ

27 ชุดดินเรนู (Renu series: Rn)



กลุ่มชุดดินที่	17
การจำแนกดิน	Fine-loamy, mixed, semiactive isohyperthermic (Aeric) Plinthic Paleaquults
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบจะมาทับบนส่วนต่ำของพื้นผิวของการ เกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลางถึงช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา	
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Ap-Btg-Btgv
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วนเนินยิ่งปนทราย และเป็นดินร่วนปนดินเนินยิ่งหรือดินเนินยิ่งในดินล่างลึกลงไป สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาปนชมพู และมี ลักษณะในดินล่างลึกลงไป มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลืองและมีโครงสร้างปูนเหลืองหรือสี แดงในดินชั้นล่าง จุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงเป็นศิลาแลงอ่อน มีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ($\text{pH } 5.0-6.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรียวัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินร้อยเอ็ด

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สมบัติทางกายภาพไม่ดี

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น


28 ชุดดินสีคิว (Si Khiu series: Si)



กลุ่มชุดดินที่	36
การจำแนกดิน	Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Rhodustalfs
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหินขาวซึ่งมาทับดินหินทรายที่มีปูนปน (calcareous sandstone) บนพื้นผิวของกาเรลี่ผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเบญจพรรณ ไม้ส่วนใหญ่เป็นปาไส่ ปลูกพีชไว้
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-Bt-BCcn
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดงเข้ม จะพบก้อนเหล็กและแมงกานีส สะสมและก้อนหินปูนสะสม ในระดับความลึกที่ต่ำกว่า 120 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินทรายที่มีปูนปน ในระดับความลึก 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง ($\text{pH } 5.5-8.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอคอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินขาวิน
 ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไว้ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น



กลุ่มชุดดินที่ 49

การจำแนกดิน Loamy-skeletal over fragmental mixed, subactive, isohyperthermic Petroferric Haplustults

การกำเนิด เกิดจากตะกอนซะมาทับบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลล่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรัง และถูกนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับทำถนน

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-Bt-Bsm-2Bgv(2Cgv)

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นถึงชั้นดานแข็งของศิลาแลง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย (ปนกรวดลูกรัง) สีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนก้อนกรวดหรือดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวดลูกรัง สีน้ำตาลหรือน้ำตาลอากาศ จะพบแผ่นศิลาแดงภายใน 50 ซม. จากผิวดินซึ่งจะจับตัวเป็นชั้นดานมีขนาดใหญ่และแข็งจนไม่สามารถที่จะเจาะผ่านได้ ในบางแห่งหน้าดินจะถูกชะล้างไปจนถึงชั้นแผ่นศิลาแดงปฏิกิริยาระบบที่เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 5.5-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชื้นแลกเปลี่ยน แคตไอคอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินอัน

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้น จะพบแผ่นศิลาแดงขนาดใหญ่และหนาจนไม่สามารถเจาะผ่านได้ พบรอยภายนอกใน 50 ซม. ซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ ไม่ควรนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร เพราะจะต้องใช้การจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นดินตื้น

30 ชุดดินสระแก้ว (Sa kaeo series: Ska)



กลุ่มชุดดินที่ 49

การจำแนกดิน	Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Paleustalfs
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดอนอยู่บนที่ราบตะกอนน้ำพาบริเวณตะพักลำนำ
สภาพพื้นที่	ลูกรดล่อนลาดเล็กน้อยถึงลูกรดล่อนลาด มีความลาดชัน 2-6 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พิชพรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-BA-Btc-C
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย (ปนก้อนกรวด) สีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวด สีน้ำตาลแก่ สีเหลืองปนแดงหรือแดงปนเหลือง ตัดลงไปเป็นดินเหนียว (ปนกรวด) สีเทาหรือเทาปนน้ำตาล จะพบจุดประสีเหลืองปนแดง แดงปนเหลืองหรือแดงของศิลาแดงอ่อนภายใน 150 ซม. จากผิวดิน ชั้นลูกรังซึ่งจับตัวกันหลวมๆ พบร่อง 20 ถึงมากกว่า 100 ซม. ภายใน 50 ซม. จากผิวดิน และชั้นลูกรังในดินล่างจะพบขี้สวนของหินควอตซ์ปะปนอยู่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.0-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ต่ำ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มน้ำแบบ	ฟองฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินโนนพิสัย

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

เป็นดินตื้น จะพบลูกรังภายใน 50 ซม. ซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ ไม่ควรจะนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร เพราะจะต้องใช้การจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นดินตื้น หรืออาจเลือกชนิดของพืชที่ปลูก



กลุ่มชุดดินที่ 29

การจำแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults

การกำนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดจะมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบรื่นลึกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ปลูกพืชไว้

การแพร่กระจาย ด้านใต้ของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย攘หรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเนินปนทราย攘หรือดินร่วนปนดินเนินขาวและเป็นดินเนินขาวหรือดินเนินขาวปนทราย攘ในดินล่างลึกลงไป สีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเนินขาวบนผิวเม็ดดินอย่างชัดเจน จะพบจุดประสีเทาในดินล่างลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง
25-50	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินในนนสูง

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์


เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ปลูกพืชไว้ ไม่รืนทัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรี เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืช

สด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน

32 ชุดดินศรีสังคราม (Si Song Khram series: Ss)



กลุ่มชุดดินที่ 4

การจำแนกดิน Fine, mixed, subactive, isohyperthermic Ustic Endoaquerts

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินอยู่ในลุ่มน้ำ

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น มีความลาดชัน 0-1 %

การระบายน้ำ เเลว

การเหลบाशของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าไผ่และพุ่มไม้เตี้ยๆ

การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Apg-Bssg

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนเนียนปนทรายแบ่งหรือดินร่วนปนดินเนียน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินเนียนปนทรายแบ่งหรือดินเนียน สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง ต่ำดูแล้งหน้าดินมีรอยแตกกระแทกง่ายและลึก จะพบรอยได้ในหน้าดดของดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคต์ไอคอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินพิมาย

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นดินเนียนง่ายจัด สมบัติทางกายภาพไม่ค่อยดี

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำนา ควรทำการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการให้กับดินและเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและทำคันดินป้องกันน้ำท่วม

33 ชุดดินสีทอน (Si Thon series: St)



กลุ่มชุดดินที่	22
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินที่ราบลุ่มสองฝั่งลำธารในระหว่างหุบเขา
สภาพพื้นที่	ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ทำนา ปลูกพืชไร่หรือพืชผักในฤดูแล้ง
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Apg-Bwg-(Cg)
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน สีดินเป็นสีน้ำตาล ดินล่างมีลักษณะไม่แน่นอน เป็นพากดินเหนียวหรือพากดินทรายและจะแสดงลักษณะการเรียงชั้นสลับกันแล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกำเนิดที่น้ำพามาทับดินในแต่ละปี มีสีเทา สีเทาปนชมพูหรือสีน้ำตาลปนเทา จะพบอุดปะสีแดงปนเหลือง สีพากสีน้ำตาลหรือสีพากสีเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินขอนแก่น
 ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการเสียหายจากน้ำท่วม
 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ทำนา แต่ควรจะมีการจัดการเรื่องคันนาให้เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ำในช่วงฤดู
 เพาะปลูกและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปูฐานบำรุงดิน

34 ชุดดินสุรินทร์ (Surin series: Su)



กลุ่มชุดดินที่	46
การจำแนกดิน	Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Rhodustalfs
การทำนิ德	เกิดจากการสลายตัว粘土พังผืดกับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเข้าของหิน bazaltic พับบริเวณที่เหลือค้างจากการกร่อนซอยแบ่งของหินภูเขาไฟ
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่นлонลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลางถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเต็งรัง ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย	พบท่างด้านได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	A-Btc-C
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเนยิ่ง (ปนกรวด) สิน้ำตาลเข้มหรือสีแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเนยิ่งปนกรวดหรือดินเนยิ่งปนกรวด สิน้ำตาลปนแดงเข้มหรือสีแดงเข้มและพบร่องน้ำของวัตถุตันกำเนิดดินภายใน 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 6.0-7.0$) ตลอด

ความลึก ^(ซม.)	อินทรีย์ตุ่น	ความชุ่มแลกเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
25-50	สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
50-100	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง


ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินกินทร์บุรี

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินตื้น มีก้อนกรวดลูกรังมากทำให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช เสื่อยต่อการขาดแคลนน้ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ กรณีที่ใช้ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชที่มีรากสั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และอื่นๆ ส่วนกรณีที่ใช้ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขุดหลุมปลูก $75 \times 75 \times 75$ ซม. หรือตอกว่า แล้วนำหน้าดินหรือดินจากที่อื่นผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ลงในหลุมปลูก ให้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงหลุมปลูก ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วงกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียง

35 ชุดดินสีก (Satuk series: Suk)



กลุ่มชุดดินที่	35
การจำแนกดิน	Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults
การทำนิ德	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหายาบชะมาทับบนพื้นผิวของการเคลื่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่นлонลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นล่อนลาด มีความลาดชัน 2-8 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลางถึงเร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียขั้น	A-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลีกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้มหรือสีน้ำตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก ($\text{pH } 4.5-5.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบล	ฟองฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน	ชุดดินวาริน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์	ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปอ ป้าทัดแทนสำหรับทำไม้เชื้ออย และไม้ผล เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ และควรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยปรับปรุงให้ดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้นและมีธาตุอาหารสมบูรณ์อยู่เสมอ

36 ชุดดินธาตุพนม (That Phanom series: Tp)



กลุ่มชุดดินที่ 33

การจำแนกดิน Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินบริเวณสันดินริมน้ำ

สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลุกคลื่นลดลงลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-4 %

การระบายน้ำ ดีปานกลาง

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้าถึงปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ปลูกพืชไว้

การแพร่กระจาย พพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแบ่งหรือดินร่วน สิน้ำตาลหรือสิน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแบ่งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแบ่ง สิน้ำตาลปนแดงหรือสิน้ำตาลและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแบ่งหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงในดินล่างลึกลงไป จะพบจุดประสีเทาปนชมพู สิน้ำตาลแก่หรือสิน้ำตาลปนเหลืองในดินหันล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 5.5-7.0$) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินกำแพงแสน และชุดดินกำแพงเพชร

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลูกไม้ผล พืชไร่และพืชผักต่างๆ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น

37 ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ (Thung Samrit series: Tsr)



กลุ่มชุดดินที่ 20

การจำแนกดิน Very fine, smectitic isohyperthermic Typic Natraquerts

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินอยู่บนที่ราบน้ำท่วมถึง

สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %

การระบายน้ำ เลา

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

พิชพรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา

การแพร่กระจาย ที่ราบลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Apg-Bssgn

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียวต่ำดิน หน้าดินมีสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาอ่อน มักพบจุดประสีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลปนแดงตลอดหน้าดิน ดูดลึกลงหน้าดินจะแตกหักแห้งกว้างและลึก บางบริเวณมีคราบเกลือบริเวณผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 5.5-7.0$) ในดินบนและเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ($\text{pH } 6.0-8.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแลกเปลี่ยน เคต์ไออ่อน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
25-50	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง
50-100	ต่ำ	สูง	สูง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินพิมาย

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินเค็มค้าง ดินเหนียวจัด หน้าแห้งดินแห่นทึบ แตกหักกว้างและลึก

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุและไธโ匹ชัม ปลูกพืชทนเค็ม และไถพรวนในช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม

38 ชุดดินท่าตูม (Tha Tum: Tt)



กลุ่มชุดดินที่ 7

การจำแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับดินอยู่บนที่ราบตะกอนน้ำพาน้ำ

สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %

การระบายน้ำ ค่อนข้างเลวถึงเลว

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลางในดินบนและช้าในดินล่าง

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนาหว่านและนาดำ

การแพร่กระจาย พบรากคตัวน้อยออกเฉียงหนึ่ง

การจัดเรียงชั้น Ap-AB-Btgv-2C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทาปนซมพูหรือสีเทา มีจุดประสีแดงและสีแดงปนเหลืองของศีลากะหลงยื่น ปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร พบรักน้ำที่มีน้ำดินเป็นดินทรายระหว่างความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ($\text{pH } 5.0-6.0$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ($\text{pH } 5.5-6.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ต่ำ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอก้อน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินพาน

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูทำนาได้

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและทำให้สมบูติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดทำแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ



กลุ่มชุดดินที่ 24

การจำแนกดิน Coarse-loamy over clayey-skeletal siliceous over kaolinitic, subactive, noncemented, isohyperthermic Oxyaqueic Haplorthods

การทำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบซะมาทับดินอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด
บนพื้นผิวของการเคลื่อนผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบรื่นลูกคลื่นลดลงตามเดือนกันuary มีความลาดชัน 1-4 %

การระบายน้ำ ดีปานกลางในดินบกและค่อนข้างเลวในดินล่าง

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว

การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็วในดินบกและช้าในดินล่าง

พิชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณ ไร่เลื่อนloy

การแพร่กระจาย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น A-E-Bhs-2C

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง ดินบกเป็นดินทรายปนดินร่วน สีเทาหรือ
สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล ถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาล ซึ่งเป็นชั้นสะสมอินทรีย์วัตถุ อะลูมิเนียม

และ/or เหล็ก (spodic horizon) ถัดลงไปเป็นดินเหนียวสีเทาอ่อน สีน้ำตาลซีดมากหรือสีขาว พบรดปะพวกรสีแดงและ
พวงสีเหลืองในดินล่างระหว่างชั้นสะสมอินทรีย์วัตถุ อะลูมิเนียมและ/or เหล็กกับชั้นดินเหนียว จะพบชั้นลูกรังจับตัวกัน
ค่อนข้างแน่นทึบในช่วงความลึกระหว่าง 50-80 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบกและ
เป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอโอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินป้านthon

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

เนื้อดินเป็นค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรรักษาไว้ให้มีสภาพเป็นป่าตามเดิม ถ้าจำไม่ใช้ในการเกษตรควรใช้ทำทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชทดแทนและความมีการจัดการดินที่ดี โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยปรับปรุงให้ดิน
มีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น

40 ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub)



กลุ่มชุดดินที่	24
การจำแนกดิน	Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Aquic Grossarenic Halopustalfs
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบะมาทับกมบกพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ค่อนข้างราบรื่นลึกคลื่นลดลงลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างเร็วถึงดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ	เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา	
การแพร่กระจาย	พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Ap-E-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองเข้ม ดินล่างตอนบนเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาล มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองเข้มหรือน้ำตาลแก่และน้ำตาลปนเทา ดินล่างตอนล่างลึก 100-200 ซม. เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ($\text{pH } 5.5-7.0$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุกแลกเปลี่ยน เคต์ไอโอน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินน้ำพอง

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สมบัติทางกายภาพไม่ดี ในฤดูแล้งดินจะแห้งงัด

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

ควรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีใส่เป็นจำนวนมากต่อไร่เพื่อปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น จัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียงกับความต้องการของพืช



กลุ่มชุดดินที่	20
การจำแนกดิน	Coarse-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Typic Halaquepts
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับดินบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ค่อนข้างราบรื่นลูกคลื่น loosenadae เล็กน้อย มีความลาดชัน 1-3 %
การระบายน้ำ	ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พิษพรonden ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ใช้ทำการเพาะปลูก庄稼เล็กน้อย บางแห่งทำนาและเป็นแหล่งทำเกลือ
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น	Apg-Bwg
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินมีการเรียงตัวสับชั้นกัน ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างมีเนื้อดินและสีของดินล่างผันแปรไปได้มาก โดยเป็นดินร่วนเนินปนทราย ดินเนินปนทรายหรือดินเนินปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีดินส่วนใหญ่เป็นสีเทาปนชมพู สีเทาปนน้ำตาลหรือสีเทา จะพบจุดปะสีน้ำตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน มีสารละลายของเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก ในหน้าแล้งจะพบคราบเกลืออยู่หน้าดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ($\text{pH } 5.0-5.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์วัตถุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน แคตไอคอน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน	ชุดดินกุดาจิ้งให้
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์	เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินเค็ม มีสารละลายของเกลืออยู่ในดินมาก ในหน้าแล้งจะพบเกลือที่หน้าดิน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์	โดยทั่วไปไม่เหมาะสมในการปลูกพืช เว้นแต่จะมีแหล่งน้ำมากพอที่จะลดความเข้มข้นของเกลือลงจึงพอจะปลูกข้าวได้ผล เลือกพันธุ์พืชทนเค็มปลูก



กลุ่มชุดดินที่	35
การจำแนกดิน	Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults
การกำเนิด	เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหายาบชะมาทับบนพื้นผิวของกาเรลี่พิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่	ลูกคลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกคลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-8 %
การระบายน้ำ	ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน	ปานกลางถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ	ปานกลาง
พิชพรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์	ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าลูกพีช ฯร.
การแพร่กระจาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียบชั้น	Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน	เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.0-6.5$) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 4.5-6.5$) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มน้ำเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินบีโลธร


ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ควรจัดทำแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืช

43 ชุดดินยางตลาด (Yang Talat series: YI)



กลุ่มชุดดินที่ 40

การจำแนกดิน Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Halustalfs

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกรากลื่น loosenada เล็กน้อยถึงลูกรากลื่น loosenada มีความลาดชัน 2-8 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ปาเต็งรัง ปลูกพืชไว้

การแพร่กระจาย พบริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินเล็ก ดินบดเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงและเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนแดงในดินล่างลึกลงไป พบรดประสีน้ำตาลแก่ในชั้นดินนี้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ($\text{pH } 5.5-6.5$) ตลอด

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินราวน

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และมีสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้นโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี จัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียงแก่ความต้องการของพืช

44 ชุดดินยโสธร (Yasothon series: Yt)



กลุ่มชุดดินที่ 35

การจำแนกดิน Fine-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults

การกำเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบะมาทับบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน

สภาพพื้นที่ ลูกรดล่อนลาดเล็กน้อยถึงลูกรดล่อนลาด มีความลาดชัน 2-8 %

การระบายน้ำ ดี

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง

การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว

พิชพวรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไว้และปลูกไม้ผล

การแพร่กระจาย พบริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดเรียงชั้น Ap-Bt

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเนินปนทราย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเป็นดินร่วนเนินปนทรายหรือดินเนินปนทราย สีแดงหรือสีแดงเข้ม ภูมิศาสตร์เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง

ความลึก (ซม.)	อินทรีย์ตุ	ความชุ่มแคบเปลี่ยน เคตไอก้อน	ความอิ่มตัวเบส	ฟอฟอรัส ที่เป็นประโยชน์	โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์	ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
0-25	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
25-50	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
50-100	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน

ชุดดินภาวน และชุดดินชุมพวง

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดทำแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช

5. สรุป

ชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ได้มีการศึกษาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดิน จำนวน 44 ชุดดิน จำแนกตามระบบอนุกรมวิธานดินออกเป็น 7 ชั้นดับ 10 ชั้นดับย่อย 20 กลุ่มใหญ่ 35 กลุ่มย่อย 43 วงศ์ สำหรับชุดดินทั้ง 44 ชุดดิน นี้จำแนกเป็นกลุ่มชุดดินโดยพิจารณาจากระดับความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาและข้อจำกัดและแนวทางในการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันนั้น แบ่งออกเป็น 21 กลุ่มชุดดิน โดยจำแนกเป็นกลุ่มดินนา 9 กลุ่ม (กลุ่มชุดดินที่ 1 4 6 7 17 20 22 24 และ 25) และกลุ่มดินดอน 12 กลุ่ม (กลุ่มชุดดินที่ 29 31 33 35 36 38 40 41 44 46 49 และ 55)

ที่ราบตะกอนน้ำพา พบอยู่เป็นบริเวณแคบๆ ระหว่างแม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำ�� ความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นจนถึงดินเหนียว การเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเป็นการปรับปรุงบำรุงดินด้วย สำหรับบริเวณที่ราบระหว่างที่ราบตะกอนน้ำพา กับพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินหรือพื้นที่เก็บราย (denudation surface or peneplain) ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย เป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินค่อนข้างเป็นกรด ควรปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์ตุ่น วัสดุปูนช่วยลดความเป็นกรดของดินและเพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราเหมาะสม สำหรับดินในบริเวณพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินหรือพื้นที่เก็บรายล่างในภูมิภาคคำน้ำใช้ในการทำนา ซึ่งเป็นนาดอนและบางส่วนใช้ในการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพด เป็นต้น ดังนั้น ช่วงที่ฝนทึ่งช่วงพืชจะขาดน้ำได้ง่ายและมักพบชั้นที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรรมชาติ (lithologic discontinuity) ตั้งแต่ 50 เซนติเมตรจากผิดนั้นไป ทำให้พบชั้นกรวดลูกวัง บางบ้าง หนาบ้าง ลึกบ้าง ตื้นบ้าง ในบางพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนใหญ่ต่ำ บางบริเวณมีปูนในดินล่างซึ่งทำให้ฟอสฟอรัสและธาตุบางอย่างอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช การจัดการดินที่ดีรวมถึงการเพิ่มอินทรีย์ตุ่นเพื่อช่วยให้สมบัติทางกายภาพดีขึ้นและการให้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี จะช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกในบริเวณนี้

บริเวณที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาร่องที่เกิดจากหินทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ยกเว้นบริเวณด้านทิศใต้ พบมีภูเขาร่องที่เกิดจากหินบะซอลต์ แทรกอยู่สำหรับด้านทิศตะวันตก จะพบหินอัคนี หินปูนหินดินดานและหินฟิลไลต์อยู่ตามริมๆ ขอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ในบริเวณที่เป็นดินตื้นและสภาพพื้นที่ลาดชันสูง บริเวณต้นน้ำลำธาร ควรพื้นฟูสภาพป่า ส่วนบริเวณดินลึกความลึกระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม โดยใช้ระบบพืชและระบบกอลร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรใช้แนวหญ้าฝergeรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

6. เอกสารอ้างอิง

กิติ มาลัยโภจน์ศิริ อนุฤทธิ์ สุจินัยและวนิชศรี อุ่นตระกูล 2547 “การกำหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จำแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธาน 2543”. เอกสารวิชาการฉบับที่ 522 ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 140 น.

คณะกรรมการจัดทำป่าฐานุกรมปฐพีวิทยา 2541 “ป่าฐานุกรมปฐพีวิทยา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 169 น.

ภูมิตร วิวัฒน์วงศ์วนา และคณะ 2543. “รายงานการสำรวจดินงานปรับเปลี่ยนที่ดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000 จังหวัดนครราชสีมา” ฉบับที่ 680 กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 211 น.

ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน. 2547. คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 519. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 33 น.

Soil Survey Division Staff. 1993. Soil Survey Manual. United States Department of Agriculture Handbook No. 18. U.S. Government Printing Office Washington, D.C. 437 p.

Soil Survey Staff. 1975. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting. “Soil Survey Agriculture Handbook No. 436. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture. U.S. Government Printing Office Wahington, D.C. 754 p.

Soil Survey Staff. 1999. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting. Soil Surveys. 2nd Edition. Agriculture Handbook No. 436 . Natural Resource Conservation Service. U.S. Department of Agriculture. U.S. Government Printing Office Washington, D.C. 869 p.

Soil Survey Staff. 2003. Keys to Soil Taxonomy. 9th Edition. Unitede States Department of Agriculture, Natural Resoures Conserveation Serice, Washington, D.C. 332 p.

United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Serice. 1996. Soil Survey Laborastory Methods Manual. Natl. Soil Sur.Cent., SSIR 42. Version 3.0. 693 p.

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตาม
ระบบอนุกรมวิธานดิน ปี 2003

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
1	Bb	Borabue	I/lsk, mixed, semiact, iso Plinthaquic Haplustults
2	Bpi	Ban Phai	I, sili, iso Arenic Paleustalfs
3	Br	Buri Rum	f, smec, iso Ustic Epiqaquerts
4	Bt	Buntharik	fl, mixed, act, iso Plinthaquic Paleustults
5	Ci	Chok Chai	vf, kao, iso Rhodic Kandiustox
6	Ckr	Chakkarat	col, mixed, subact, iso Typic (Oxyaquic) Paleustults
7	Cpg	Chum Phuang	col, sili, iso Typic Kandiustalts
8	Cph	Chumphon Buri	col, mixed, act, iso Typic Dystrustepts
9	Ct	Chatturat	f, mixed, act, iso Typic Haplustalts
10	Cu	Chan Thuek	I, sili, iso Typic Ustipsammements
11	Dk	Dan Khun Thot	s, sili, coated, iso Ustic Quartzipsammements
12	Ht	Huai Thalaeng	col, mixed, semiact, iso Typic Paleustults
13	Kg	Khambong	s, sili, iso Typic Haplustalts
14	Ki	Kula Ronghai	fl, mixed, act, iso Typic Natraqualfs
15	Kmr	Khemarat	fl/c, kao, iso Plinthaquic Haplustults
16	Kt	Khorat	fl, sili, iso Typic (Oxyaquic) Kandiustalts
17	Lo	Loei	vf, kao, iso Typic Eutrustox
18	Msk	Maha Sarakham	I, sili, subact, iso Oxyaquic Arenic Haplustalts
19	Ng	Nam Phong	I, sili, iso Grossarenic Haplustalts
20	Nn	Nakhon Phanom	f, kao, iso Aeric Plinthic Paleaqueults
21	On	On	lsk/frag, mixed, subact, iso Aeric (Plinthic) Epiaqueults [Petroferric Epiaqueults]
22	Pc	Pak Chong	vf, kao, iso Rhodic Kandiustox
23	Pm	Phimai	vf, smec, iso Ustic Endoaquerts
24	Pn	Phen	lsk, mixed, subact, iso Aeric Plinthic Paleaqueults
25	Pp	Phon Phisai	lsk/c, kao, iso Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults
26	Re	Roi Et	fl, mixed, subact, iso Aeric Kandiaqueults
27	Rn	Renu	fl, mixed, semiact, iso (Aeric) Plinthic Paleaqueults
28	Si	Sikhio	fl, mixed, iso Typic Rhodustalts
29	Sk	Sakon	lsk/frag, mixed, subact, iso Petroferric Haplustults
30	Ska	Sa Kaeo	lsk, kao, iso Typic (Plinthic) Paleustalts
31	Sn	Sung Noen	f, mixed, semiact, iso Typic Paleustults
32	Ss	Si Songkhram	f, mixed, subact, iso Ustic Endoaquerts
33	St	Si Thon	col, mixed, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts
34	Su	Surin	csk, kao, iso Typic Rhodustalts
35	Suk	Satuek	fl, sili, subact, iso Typic Paleustults
36	Tp	That Phanom	fsi, mixed, semiact, iso Ultic Haplustalts
37	Tsr	Thung Samrit	vf, smec, iso Typic Natraquerts
38	Tt	Tha Tum	f, mixed, semiact, iso Aeric (Plinthic) Endoaqueults
39	Tu	Tha Uthen	col/csk, sili/kao, subact, noncemented, iso Oxyaquic Haplorthods
40	Ub	Ubon	I, sili, semiact, iso Aquic Grossarenic Haplustalts
41	Ud	Udon	col, mixed, act, nona, iso Typic Halaquepts
42	Wn	Warin	fl, sili, iso Typic Kandiustalts
43	Yl	Yang Talat	col, sili, semiact, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalts
44	Yt	Yasothon	fl, sili, semiact, iso Typic Paleustults

หมายเหตุ

1. การจำแนกดินในวงเดือน

(....) = สามารถจำแนกดินได้ทั้ง 2 แบบ และ [...] = ลักษณะที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ.2003

2. คำย่อ

Particle-size classes (ชั้นขนาดอนุภาคดิน):

col	= coarse-loamy
col/c	= coarse-loamy over clayey
col/csk	= coarse-loamy over clayey-skeletal
cosil	= coarse-silty
csk	= clayey-skeletal
f	= Fine
fl	= fine-loamy
fl/c	= fine-loamy over clayey
fl/csk	= fine-loamy over clayey-skeletal
fsi	= fine-silty
l	= Loamy
l/lsk	= loamy over loamy-skeletal
lsk	= loamy-skeletal
lsk/c	= loamy-skeletal over clayey
lsk/frag	= loamy-skeletal over fragments
s	= Sandy
vf	= very-fine

Mineralogy classes (ชั้นแร่วิทยาของดิน):

kao	= kaolinitic
mixed	= mixed
sili	= siliceous
sili/kao	= siliceous over kaolinitic

Cation-exchange activity classes

(ชั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแคนต์ไอโอน):

act	= kaolinitic
semiact	= semiactive
subact	= subactive
superact	= superactive

Calcareous and reaction classes

(ชั้นการมีปูนปนและปฏิกิริยา):

nona	= nonacid
a	= acid

Soil temperature classes (ชั้นอุณหภูมิดิน):

iso	= Isohyperthermic
hyper	= hyperthermic
thermic	= thermic

ตารางภาคผนวกที่ 2 สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย

ตามระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ. 2003

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
1	Ban	Bang Mun Nak	vf, mixed, semiact, nona, iso Aeric Endoaquepts
2	Bg	Ban Chong	f, kao, iso Typic (Kandic) Paleustults
3	Bo	Bo Thai	col, kao, iso Typic Eutrustox
4	Bpo	Ban Phot	vf, smec, iso (Chromic) Ustic Epiaquerts
5	Cd	Chai Badan	f, smec, iso Leptic Haplustersts
6	Ce	Chiang Saen	vf, kao, iso Typic Kandiustults
7	Cg	Chiang Khong	vf, kao, iso Typic Kandiustox
8	Ch	Chiang Khan	csk, kao, iso Typic Kandiustults
9	Cm	Chiang Mai	col, mixed, superact, nona, iso Oxyaquaic Ustifluvents
10	Cr	Chiang Rai	f, kao, iso Plinthic Paleaquults (Kandiaquults)
11	Dl	Dong Lan	f, mixed, act, iso Vertic (Aquaic) Haplustolls
12	Don	Dong Yang En	fsi, mixed, act, iso Oxyaquaic (Ultic) Haplustalfs
13	Dp	Doi Pui	f, kao, hyper (iso or thermic) Kandic Palehumults
14	Ds	Dan Sai	fl, kao, iso Typic Kandiustults
15	Hc	Hang Chat	fl, kao, iso Typic Kandiustults
16	Hd	Hang Dong	f, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs
17	Kp	Kamphaeng Phet	fsi, mixed, act, iso Oxyaquaic (Ultic) Haplustalfs
18	La	Lom Sak	fsi, mixed, superact, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts
19	Li	Li	csk, mixed, semiact, iso, shallow Ultic Haplustalfs
20	Lk	Lom Kao	fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquaic) Paleustults
21	Ln	Lam Narai	f, smec, iso Vertic Haplustolls
22	Lp	Lampang	fsi, mixed, semiact, iso Typic (Aeric) Endoaqualfs
23	Ls	Lam Sonthi	f, mixed, act, iso Oxyaquaic (Ultic) Haplustalfs
24	Mr	Mae Rim	lsk, mixed, iso Typic (Kandic) Paleustults
25	Ms	Mae Sai	fsi, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs
26	Mt	Mae Taeng	f, kao, iso Rhodic Kandiustults
27	Mta	Mae Tha	fsi, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs
28	Na	Nan	f, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs
29	Nal	Nam Len	vf, smec, iso Aquertic Paleustalfs
30	Ncu	Nam Chun	csk, mixed, act, iso Aquic Haplustalfs
31	Nd	Nam Duk	fsi, mixed, act, iso Oxyaquaic Paleustalfs
32	Nm	Nong Mot	f, kao, iso Typic Kandiustults
33	Ns	Nakhon Sawan	lsk, mixed, superact, iso Ultic Haplustalfs
34	Pao	Phayao	fl/csk, mixed, semiact, iso Plinthic Paleustalfs
35	Pe	Phetchabun	fl (l/lsk), mixed, semiact, iso Ultic Paleustalfs
36	Ph	Phan	f, kao, iso Typic (Plinthic) Endoaqualfs
37	Png	Phon Ngam	fl, mixed, semiact, iso Typic Haplustults
38	Po	Pong Tong	csk, kao, iso Typic (Kandic) Paleustults
39	Ps	Phu Sana	lsk, mixed, iso Kanhaplic Haplustults

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
40	Sai	San Sai	col, sili, subact, iso Aeric Endoaqualfs
41	Sat	Samo Thod	vf, smec, iso Chromic Haplusterts
42	Sg	Sai Ngam	col, mixed, semiact, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs
43	So	Sop Prap	f, smec, iso Lithic Haplustolls
44	Sp	San Pa Tong	col, sili, semiact, iso Typic (Kandic) Paleustults
45	Sri	Si Thep	fsi, mixed, subact, iso Plinthic Paleaquepts
46	Tk	Takhli	lск, carn, iso Entic Haplustolls
47	Tl	Tha Li	csk, mixed, semiact, iso Ultic Haplustalfs
48	Tn	Tha Phon	f, mixed, superact, nona, iso Aeric Endoaquepts
49	Tph	Taphan Hin	fsi, mixed, act, iso Ultic Haplustalfs
50	Utt	Uttaradit	f, mixed, semiact, iso Aquic Haplustalfs
51	Wa	Watthana	f, smec, iso Ustic Endoaquerts
52	Wb	Wichian Buri	l, mixed, act, iso Aquic (Arenic) Haplustalfs
53	Wc	Wang Chomphu	vf, smec, iso Chromic Haplusterts
54	Wi	Wang Hai	f, mixed, act , iso Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs
55	Ws	Wang Saphung	f, mixed, act, iso Typic Haplustalfs

ตารางภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทยตามระบบอนุกรมวิธานดิน
ปี ค.ศ. 2003

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
1	Ay	Ayutthaya	vf, mixed, act, acid, iso Vertic Endoaquepts
2	Bk	Bangkok	vf, smec, nona, iso Vertic Endoaquepts
3	Bl	Bang Len	f, smec, iso Vertic Endoaquolls
4	Bm	Ban Mi	vf, smec, iso Ustic Epiaquerts
5	Bn	Bang Khen	f, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts
6	Bp	Bang Nam Pria	vf, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts
7	Bpg	Bang Pakong	f, mixed, a, iso Typic Sulfaquents
8	Bph	Bang Phae	fsi, mixed, act, iso Typic Endoaquolls
9	Ca	Cha-am	vf, mixed, semiact, iso Sulfic Endoaquepts
10	Cc	Chachoengsao	f(vf), mixed, nona, semiact, iso Vertic Endoaquepts
11	Ck	Chong Khae	vf, smec, iso (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts
12	Cs	Chum Saeng	f, mixed, semiact, a, iso Aeric (Plinthic) Endoaquepts
13	Db	Doem Bang	f, kao, iso Aeric (Plinthic) Endoaqualfs
14	Dc	Don Chedi	col, mixed, act, iso Typic Dystrustepts
15	Dm	Don Mueang	fl, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
16	Dr	Don Rai	fl, kao, iso Typic Kandiustults
17	Dt	Dong Takhian	coated, iso Lamellic Ustic Quartzipsammments
18	Hg	Hup Kraphong	col, mixed, act, iso Typic Haplustalfs
19	Hk	Hin Kong	fsi, mixed, subact, iso Typic Paleaquults
20	Kk	Khok Krathiam	vf, smec, iso Ustic Endoaquerts
21	Ks	Kamphaeng Saen	fsi, mixed, semiact, iso Typic Haplustalfs
22	Kyo	Khao Yoi	fl, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs
23	Lb	Lop Buri	vf, smec, iso Typic Haplusterts
24	Ly	Lat Ya	fl, sili, iso Kanhaplic Haplustults
25	Ma	Maha Phot	vf, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts
26	MI	Muak Lek	csk, mixed, semiact, shallow, iso Ultic Haplustalfs
27	Mn	Manorom	f, mixed, semiact, iso Aeric (Plinthic) Endoaqualfs
28	Nk	Nong Kae	fl, mixed, act, iso Aquic Natrustalfs
29	Np	Nakhon Pathom	f, mixed, act, iso Aeric Endoaqualfs
30	Ok	Ongkharak	vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
31	Pb	Phetchaburi	fsi, mixed, act, iso Aquic Haplustalfs
32	Pth	Pak Tho	f, kao, iso (Aeric) Plinthic Paleaquults
33	Rb	Ratchaburi	f, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts
34	Rs	Rangsit	vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
35	Sa	Sapphaya	fl, mixed, act, nona, iso Aquic (Fluventic) Haplustepts
36	Sb	Saraburi	vf, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts
37	Se	Sena	vf, mixed, act, a, iso Sulfic Endoaquepts
38	Sin	Sing Buri	vf, mixed, semiact, nona, iso Vertic Endoaquepts
39	Sm	Samut Prakan	f, mixed, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts
40	Tan	Thanyaburi	vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
41	Tc	Tha Chin	f, smec, nona, iso Sodic Hydراquents
42	Tm	Tha Muang	col, mixed, act, calcareous, iso, Typic Ustifluvents
43	Tq	Tha Khwang	f, mixed, semiact, a, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts
44	Tr	Tha Ruea	vf, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts
45	Ty	Tha Yang	lsk, sili, iso Kanhaplic Haplustults

ตารางภาคผนวกที่ 4 สรุปผลการจำแนกดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยตามระบบอนุกรมวิธานดินปี ค.ศ. 2003

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
1	Ak	Ao Luek	vf, kao, iso Rhodic Kandiudox
2	Ba	Bang Nara	f, kao, iso Typic Paleaquults
3	Bbg	Ban Bueng	coated, iso Oxyaquin Quartzipsammements
4	Bc	Bacho	coated, iso Typic Quartzipsammements
5	Bh	Ban Thon	s, sili, superact, ortstein, iso Typic Haplorthods
6	Bng	Buong Chanang	f, mixed, superact, iso Fluventic Eutrudepts
7	Bu	Sai Buri	fsi, kao, iso Aquic Kandiudults
8	Cb	Chon Buri	fl, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs
9	Chl	Chalong	fl, kao, iso Typic Kandiudults
10	Cp	Chumphon	csk, kao, iso Typic Paleudults
11	Cya	Chaiya	fl, sili, subact, nona, iso Fluvquentic Endoaquepts
12	Cyi	Chian Yai	f, mixed, superact, a, iso Haplic Sulfaquents
13	Fd	Fang Daeng	fl, kao, iso Rhodic Kandiudults
14	Gk	Su-ngai Kolok	f, kao, iso Typic Endoaquults
15	Hh	Hua Hin	coated, iso Typic Quartzipsammements
16	Ho	Huai Yot	lsk, mixed, semiact, a, shallow, iso Typic Uderthents
17	Hp	Huai Pong	f, kao, iso Typic Kandiudults
18	Hy	Hat Yai	csk, kao, iso Typic Paleudults
19	Kat	Kantang	csk, kao, iso Typic (Aquinic) Plinthudults
20	Kbi	Krabi	f, kao, iso Typic Kandiudults
21	Kc	Khlong Chak	csk, kao, iso Typic Kandihumults
22	Kd	Kab Daeng	I, mixed, superact, dysic, iso Terric Sulfihemists
23	Kh	Kho Hong	col, kao, iso Typic Kandiudults
24	Kkl	Khuan Kalong	fl, kao, iso Typic Kandiudults
25	Kkt	Khao Khat	csk, kao, iso Typic (Kandic) Plinthudults
26	Kl	Klaeng	vf, kao, iso Typic Plinthaquults
27	Klt	Khlong Teng	fl, mixed, semiact, shallow, iso Typic Haplohumults
28	Km	Khlong Thom	fl, kao, iso Typic Kandiudults
29	Knk	Klong Nok Krathung	fl, kao, iso Typic Kandiudults
30	Ko	Khok Khain	fl, kao, iso Typic Kandiaquults
31	Koi	Khok Kloi	f, kao, iso Typic Kandiudults
32	Koy	Ko Yai	cosil, mixed, superact, nona, iso Typic Tropaquepts
33	Kut	Khlong Khut	f, kao, iso Kandic Plinthaquults
34	Lam	Lam Kaen	fsi, mixed, semiact, iso Typic Haplohumults
35	Lan	Lang Suan	coated, iso Typic Quartzipsammements
36	Lgu	La-ngu	f, mixed, iso Typic Endoaqualfs
37	Lh	Lahan	fl, sili, subact, iso Typic Paleudults
38	Li	Lamphu La	f, mixed, semiact, iso Typic Palehumults
39	Mak	Makham	col/c, sili/kao, subact, nona, iso Fluvquentic Eutrudepts
40	Mik	Mai Khao	coated, iso Typic Quartzipsammements
41	Mu	Munoh	f, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
42	Nat	Na Thawi	col, kao, iso Typic Kandiudults
43	Nb	Nong Bon	f, kao, iso Typic Kandiudults
44	Ni	Nam Krachai	col, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults
45	Nok	Nong Khla	csk, kao, iso Typic Kandiudults
46	Ntm	Na Tham	fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquinic) Plinthudults
47	Ntn	Na Thon	f, mixed, semiact, iso Typic Haplohumults
48	Nw	Narathiwat	dysic, iso Typic Haplifibrist
49	Oc	O Lum Chiak	vf, mixed, act, iso Typic Hapludalfs

ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชุดดิน	การจำแนกดิน
46	Ntm	Na Tham	fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquic) Plinthudults
47	Ntn	Na Thon	f, mixed, semiact, iso Typic Haplohumults
48	Nw	Narathiwat	dysic, iso Typic Haplifibrists
49	Oc	O Lum Chiak	vf, mixed, act, iso Typic Hapludalfs
50	Pac	Pak Chan	vf, kao, iso Typic Palehumults
51	Pad	Padang Besar	col/csk, sili/kao, subact, iso Typic Paleudults
52	Pat	Phak Kat	f, mixed, semiact, iso Plinthaquic Paleudalfs
53	Paw	Phawong	vf, kao, iso Umbric Paleaquults
54	Pga	Phang-nga	f, kao, iso Typic Kandiudults
55	Pi	Su-ngai Padi	fl, sili, subact, iso Aeric Paleaquults
56	Pk	Phuket	f, kao, iso Typic Kandiudults
57	Pkm	Pak Khom	fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquic) Plinthudults
58	Pon	Pong Nam Ron	fl, mixed, act, shallow, iso Typic Hapludolls
59	Ptg	Phan Thong	fsi, mixed, superact, nona, iso Mollic Endoaquepts
60	Pti	Pattani	col, mixed, superact, nona, iso Sulfic Endoaquepts
61	Ptl	Phatthalung	f, kao, iso Plinthic Paleaquults
62	Pto	Phato	lsk, mixed, semiact, iso Typic Hapludults
63	Ptu	Pathio	f, kao, iso Typic Kandiudults
64	Py	Phatthaya	coated, iso Typic Quartzipsammements
65	Pym	Phayom Ngam	fl, kao, iso Kandic Plinthaquults
66	Ra	Ra-ngae	vf, mixed, superact, a, iso Sulfic Endoaquepts
67	Ran	Ranot	vf, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs
68	Rg	Ranong	lsk, mixed, semiact, a, iso Lithic Udorthents
69	Ro	Rueso	fsi, mixed, semiact, iso Typic Palehumults
70	Ry	Rayong	uncoated, iso Typic Quartzipsammements
71	Sak	Sai Khao	sili, iso Humaqueptic Psammaquents
72	Sd	Sadao	col, kao, iso Typic Kandiudults
73	Sh	Sattahip	coated, iso Typic Quartzipsammements
74	Sng	Songkhla	fl, sili, subact, iso Aquic Paleudults
75	Stn	Sathon	fl, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults
76	Stu	Satun	col/c, kao, iso Kandic Plinthaquults
77	Sw	Sawi	lsk, mixed, semiact, iso Typic Paleudults
78	Ta	Tak Bai	fsi, mixed, semiact, a, iso Typic Endoaquepts
79	Tac	Tha Chang	lsk, kao, iso Typic (Kandic) Plinthudults
80	Td	Trat	f, kao, iso Typic Kandiudults
81	Te	Tha Sae	fl, kao, iso Typic Kandiudults
82	Tg	Thung Wa	col, sili, subact, iso Typic Paleudults
83	Ti	Tha Mai	f, kao, iso Typic Haplodox
84	Tim	Thai Mueang	f, kao, iso Typic Kandiudults
85	Tkn	Tha Khun	col, mixed, superact, a, iso Typic Udifluvents
86	Tkt	Takua Thung	fsi, mixed, superact, a, iso Typic Sulfaquents
87	Tng	Trang	f, kao, iso Typic Kandiudults
88	Ts	Thon Sai	fl, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts
89	Tsl	Tha Sala	f, kao, iso Typic Endoaquults
90	Tuk	Thung Kai	csk, mixed, act, nona, iso Aeric Endoaquepts
91	Vi	Visai	fl, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults
92	Wat	Wang Tong	f, kao, iso Typic (Aquic) Plinthudults
93	Wp	Wan Priang	sili, iso Typic Psammaquents
94	Ya	Yala	csk, kao, iso Typic Kandiudults
95	Yg	Yi-ngo	lsk, mixed, semiact, iso Typic Paleudults
96	Yk	Yan Ta Khao	lsk, mixed, semiact, iso Typic (Aeric) Plinthaquults

ตารางภาคผนวกที่ 5 การจำแนกดินที่จัดตั้งรวมทุกภาคของประเทศไทยตามระบบอนุกรรมวิถีดิน
ปี ค.ศ. 2003 และกลุ่มชุดดิน

อันดับ	อันดับย่อย	กลุ่มใหญ่	กลุ่มย่อย	วงศ์	ชุดดิน	ภาค	กลุ่มชุดดิน
Histosols	Fibrists	Haplofibrists	Typic	dysic, iso	Narathiwat	Nw	S 58
	Hemists	Sulfihemists	Terric	I, mixed, superact, dysic, iso	Kab Daeng	Kd	S 51
Spodosols	Orthods	Haplorthods	Oxyaquic	col/csk, sili/kaeo, subact, noncemented, iso	Tha Uthen	Tu	NE 24
			Typic	s, sili, superact, ortstein, iso	Ban Thon	Bh	S 6
Oxisols	Ustox	Eutrustox	Typic	vf, kao, iso	Loei	Lo	NE 31
				col, kao, iso	Bo Thai	Bo	N 37
		Kandiustox	Rhodic	vf, kao, iso	Chok Chai	Ci	NE 29
					Pak Chong	Pc	NE 29
			Typic	vf, kao, iso	Chiang Khong	Cg	N 29
	Udox	Kandiudox	Rhodic	vf, kao, iso	Ao Luk	Ak	S 26
		Hapludox	Typic	f, kao, iso	Tha Mai	Ti	S 27
	Vertsols	Aquiaerts	Natraquiaerts	Typic	Tung Samrit	Tsr	NE 20
			Epiquiaerts	Ustic	Buri Ram	Br	NE 1
				f, smec, iso	Ban Mi	Bm	C 1
				(Chromic) Ustic	Ban Phot	Bpo	N 1
			Endoaquiaerts	Ustic	Khok Krathiam	Kk	C 1
Ultisols	Aquults	Plinthaquults		f, smec, iso	Watthana	Wa	N 1
			Kandic	vf, smec, iso	Phimai	Pm	NE 4
				f, mixed, subact, iso	Si Songkhram	Ss	NE 4
				(Aeric Chromic) Ustic	Chong Kae	Ck	C 1
			Leptic	vf, smec, iso	Chai Badan	Cd	N 28
			Chromic	vf, smec, iso	Samo Thod	Sat	N 28
					Wang Chomphu	Wc	N 28
			Typic	vf, smec, iso	Lop Buri	Lb	C 28
		Kandiaquults	Kandic	col/c, kao, iso	Satun	Stu	S 6
				fl, kao, iso	Phayom Ngam	Pym	S 25
				f, kao, iso	Khlong Kut	Kut	S 32
			Typic (Aeric)	lsk, mixed, semiact, iso	Yan Ta Khao	Yk	S 25
			Typic	col, mixed, semiact, iso	Nam Krachai	Ni	S 22
		Paleaquults		fl, mixed, semiact, iso	Sathon	Stn	S 25
					Visai	Vi	S 17
				vf, kao, iso	Klaeng	Kl	S 26
			Typic	fl, mixed, act, iso	Roi Et	Re	NE 17
				fl, kao, iso	Khok Khian	Ko	S 16
		Paleaquults	Plinthic	fsi, mixed, subact, iso	Si Thep	Sri	N 16
		(Kandiaquults)	Plinthic	f, kao, iso	Chiang Rai	Cr	N 6
					Phatthalung	Ptl	S 6
			(Aeric) Plinthic	fl, mixed, semiact, iso	Renu	Rn	NE 17
				f, kao, iso	Pak Tho	Pth	C 6
			Aeric	fl, sili, subact, iso	Su-nga iPad	Pi	S 17
		Epiaquults	Aeric Plinthic	lsk, mixed, subact, iso	Phen	Pn	NE 25
				f, kao, iso	Nakhon Phanom	Nn	NE 6
			Aeric (Plinthic), [Petroferric]	lsk/frag, mixed, subact, iso	On	On	NE 25
			Paleustults	Plinthaquic	Buntharik	Bt	NE 17hi/35b
				fl, mixed, iso	Phawong	Paw	S 6
		Endoaquults	Umbric	vf, kao, iso	Hin Kong	Hk	C 16
				fsi, mixed, subact, iso	Bang Nara	Ba	S 43
			Typic	f, kao, iso	Su-ngai Kolok	Gk	S 43
					Tha Sala	Tsl	S 6

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

อันดับ	อันดับย่อย	กลุ่มใหญ่	กลุ่มย่อย	วงศ์	ชุดดิน	ภาค	กลุ่ม	ชุดดิน
Ultisols	Humults	Kandihumults	Typic	csk, kao, iso	Khlong Chak	Kc	S	6
		Palehumults	Kandic	f, kao, hyper (iso or thermic)	Doi Pui	Dp	N	30
			Typic	fsi, mixed, semiact, iso	Ruso	Ro	S	17
				f, mixed, semiact, iso	LamphuLa	Li	S	19
		Haplohumults	Typic	vf, kao, iso	Pak Chan	Pac	S	26
	Udults	Plinthudults		fl, mixed, semiact, shallow, iso	Khlong Teng	Klt	S	34
				fsi, mixed, semiact, iso	Lam Kaen	Lam	S	26
				f, mixed, semiact, iso	Na Thon	Ntn	S	53
			Typic (Kandic)	lск, kao, iso	Tha Chang	Tac	S	45
				csk, kao, iso	Khao Khat	Kkt	S	17
Ustisols	Kandiudults	Aquic	Typic (Aquic)	csk, kao, iso	Kantang	Kat	S	45
				fl, mixed, semiact, iso	Na Tham	Ntm	S	34
				f, kao, iso	Pak Khom	Pkm	S	17
					Wang Tong	Wat	S	6
			Aquic	fsi, kao, iso	Sai Buri	Bu	S	17
			Rhodic	fl, kao, iso	Fang Daeng	Fd	S	45
			Typic	csk, kao, iso	Nong Khla	Nok	S	27
					Yala	Ya	S	45
				col, kao, iso	Kho Hong	Kh	S	34
					Na Thawi	Nat	S	39
Ustisols	Paleudults	Aquic			Sadao	Sd	S	39
				fl, kao, iso	Chalong	Chl	S	10
					Khlong Nok Krathung	Knk	S	34
					Khuan Ka Long	Kkl	S	39
					Khlong Thom	Km	S	6
					Tha Sae	Te	S	34
				f, kao, iso	Huai Pong	Hp	S	57
					Krabi	Kbi	S	45
					Khok Kloi	Koi	S	26
					Nong Bon	Nb	S	22
Ustisols	Kandiustults	Rhodic (Oxyaquic)			Phangnga	Pga	S	26
					Phuket	Pk	S	26
					Pathiu	Ptu	S	26
					Trat	Td	S	53
					Thai Muang	Tim	S	26
					Trang	Tng	S	53
			Aquic	fl, sili, subact, iso	Songkhla	Sng	S	17
			Typic	lск, mixed, semiact, iso	Sawi	Sw	S	50
					Yi-ngo	Yg	S	51
					Chumphon	Cp	S	18
Ustisols	Hapludults	Typic			Hat Yai	Hy	S	25
				col/csk, sili/kao, subact, iso	Padang Besar	Pad	S	53
				col, sili, subact, iso	Thung Wa	Tg	S	39
				fl, sili, subact, iso	Lahan	Lh	S	43
					Phato	Pto	S	50
				lск, mixed, semiact, iso	Mae Taeng	Mt	N	29
					Korat	Kt	NE	35
					Chiang Khan	Ch	N	46
				col sili, iso	Chum Phuang	Cpg	NE	40
				fl, sili, subact, iso	Warin	Wn	NE	35
Ustisols	Kandiustults	Typic			Don Rai	Dr	C	35
					Dan Sai	Ds	N	35
				fl, kao, iso	Hang Chat	Hc	N	35
				f, kao	Nong Mot	Nm	N	29
				vf, kao, iso	Chiang Saen	Ce	N	30

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

อันดับ	อันดับข่ายกลุ่มใหญ่	กลุ่มข่าย	วงศ์	ชุดดิน	ภาค	กลุ่ม	
				ชุดดิน		ชุดดิน	
Ultisols	Ustults	Paleustults	Oxyaqueic	col, mixed, subact, iso	Chakkarat	Ckr NE 40	
			Plinthaqueic	fl, mixed, iso	Buntharik	Bt NE 17hi/35b	
			Typic (Oxyaqueic)	lск/c, kao, iso	Phon Phisai	Pp NE 49	
			Plinthic)				
			Typic (Kandic)	lск, mixed, iso	Mae Rim	Mr N 48	
				csk, kao, iso	Pong Tong	Po N 46	
				col, sili, semiact, iso	San Pa Tong	Sp N 40	
				f, kao, iso	Ban Chong	Bg N 29	
			Typic (Aqueic)	fl, mixed, semiact, iso	Lom Kao	Lk N 17	
			Typic	col, mixed, semiact, iso	Huai Thalaeng	Ht NE 40	
Mollisols	Aquolls	Endoaquolls		fl, sili, semiact, iso	Yasothon	Yt NE 35	
				fl, sili, subact, iso	Satuk	Suk NE 35	
				f, mixed, semiact, iso	Sung Noen	Sn NE 29	
			Haplustults	lск/frag, mixed, subact, iso	Sakon	Sk NE 49	
			Plinthaqueic	l/lск, mixed, semiact, iso	Borabu	Bb NE 49	
				fl/c, kao, subact, iso	Khemarat	Kmr NE 17hid3c	
			Kanhaplic	lск, sili, iso	Tha Yang	Ty C 48	
				fl, sili, iso	Lat Ya	Ly C 56	
				lск, mixed, iso	Phu Sana	Ps N 46	
			Typic	fl, mixed, semiact, iso	Phon Ngam	Png N 56	
Alfisols	Aqualfs	Natraqualfs	Vertic	f, smec, iso	Bang Len	Bl C 3	
			Typic	fsi, mixed, act, iso	Bang Phae	Bph C 3	
			Ustolls	Lithic	Sop Prap	So N 47	
				Vertic	Lam Narai	Ln N 54	
				Vertic (Aqueic)	Dong Lan	Di N 38	
				Entic	Takhli	Tk N 52	
				Typic	Pong Nam Ron	Pon S 47	
			Natraqualfs	Typic	Kula Ronghai	Ki NE 20	
			Endoaqualfs	col, sili, subact, iso	San Sai	Sai N 22	
				fl, mixed, semiact, iso	Khao Yoi	Kyo C 18	
Ustalfs	Natrustalfs	Paleustalfs		fsi, mixed, semiact, iso	Mae Tha	Mta N 15	
					Mae Sai	Ms N 15	
				f, mixed, semiact, iso	Nan	Na N 7	
				f, mixed, act, iso	Nakhon Pathom	Np C 7	
				Aeric (Plinthic)	Manorom	Mn C 6	
					Tha Tum	Tt NE 7	
					Doembang	Db C 7	
				Typic (Aeric)	Lampang	Lp N 16	
				Typic (Plinthic)	Phan	Ph N 5	
				Typic	Chon Buri	Cb S 34	
Paleustalfs	Rhodustalfs	Haplustalfs			Hang Dong	Hd N 5	
					Langu	Lgu S 5	
					vf, mixed, semiact, iso	Ranot	Ran S 7
				Aquic	Nong Kae	Nk C 20	
				Aquertic	Nam Len	Nal N 28	
				Oxyaqueic	Nam Duk	Nd N 33	
				Oxyaqueic (Ultic)	Wang Hai	Wi N 31	
				Plinthic	Phayao	Pao N 48/56	
			Ultic	fl (l/lск), mixed, semiact, iso	Phetchabun	Pe N 56	
			Typic (Plinthic)	lск, kao, iso	SaKaeo	Ska NE 49	
Rhodustalfs			Typic	csk, kao, iso	Surin	Su NE 46	
				fl, mixed, semiact, iso	Sikhlu	Si NE 36	
			Aquic	csk, mixed, act, iso	Nam Chun	Ncu N 48	
				fsi, mixed, act, iso	Phetchaburi	Pb C 21	
				f, mixed, semiact, iso	Uttaradit	Utt N 7	
			Aquic (Arenic)	l, mixed, act, iso	Wichian Buri	Wb N 19/41	
			Aquic Arenic	l, sili, semiact, iso	Ubon	Ub NE 24	
			Oxyaqueic Arenic	l, sili, subact, iso	Maha Sarakham	Msk NE 41	

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

อันดับ	อันดับชั้น почวิถี	กลุ่มชั้น	วงศ์	ชุดดิน	ภาค	กลุ่ม	ชุดดิน	
Alfisols	Ustalfs	Haplustalfs	Oxyaquic (Ultic)	col, mixed, semiact, iso	Sai Ngam	Sg	N	38
				col, sili, semiact, iso	Yang Talat	YI	NE	40
				fsi, mixed, act, iso	Dong Yang En	Don	N	33
				f, mixed, act, iso	Kamphaeng Phet	Kp	N	33
					Lam Sonthi	Ls	N	31
	Arenic		Ultic	I, sili, act, iso	Ban Phai	Bpi	NE	41
				I, sili, semiact, iso	Nam Phong	Ng	NE	44
				lsk, mixed, superact, iso	Nakhon Sawan	Ns	N	47
				csk, mixed, semiact, shallow, iso	Li	Li	N	47
				csk, mixed, semiact, iso	Muak Lek	Ml	C	47
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Typic	fsi, mixed, semiact, iso	Tha Li	Tl	N	47
				fsi, mixed, act, iso	That Phanom	Tp	NE	33
				fsi, mixed, act, iso	Taphan Hin	Tph	N	33
				col, mixed, act, iso	Hup Kapong	Hg	C	40
				fsi, mixed, semiact, iso	Kamphaeng Saen	Ks	C	33
	Hapludalfs	Plinthaquic	Sulfic	s, sili, iso	Khambong	Kg	NE	41
				f, mixed, act, iso	Chatturat	Ct	NE	55
					Wang Saphung	Ws	N	55
				vf, mixed, act, iso	O Lum Chiak	Oc	S	53
				f, mixed, semiact, iso	Phak Kat	Pat	S	7
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Vertic	vf, mixed, semiact, iso	Cha-am	Ca	C	9
				col, mixed, superact, nona, iso	Pattani	Pti	S	14
				col, mixed, act, nona, iso	Udon	Ud	NE	20
				fl, mixed, semiact, a, iso	Don Muang	Dm	C	11
					ThonSai	Ts	S	14
				f, mixed, semiact, a, iso	Munoh	Mu	S	39
				vf, mixed, superact, a, iso	Rangae	Ra	S	14
				vf, mixed, semiact, a, iso	Ongkharak	Ok	C	10
					Rangsit	Rs	C	11
				vf, mixed, act, a, iso	Thanyaburi	Tan	C	11
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Vertic (Aeric)		Sena	Se	C	11
				vf, smec, nona, iso	Bangkok	Bk	C	3
				f (vf), mixed, semiact, nona, iso	Chachoengsao	Cc	C	3
				vf, mixed, semiact, nona, iso	Sing Buri	Sin	C	4
				f, mixed, act, a, iso	Bang Khen	Bn	C	2
				vf, mixed, act, a, iso	Ayutthaya	Ay	C	2
					Maha Phot	Ma	C	2
				vf, mixed, act, a, iso	Bang Nam Prieo	Bp	C	2
				f, mixed, semiact, a, iso	Tha Khwang	Tq	C	2
				f, mixed, act, nona, iso	Ratchaburi	Rb	C	4
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Vertic (Aeric)	vf, mixed, act, nona, iso	Saraburi	Sb	C	4
					Tha Rua	Tr	C	4
				col, mixed, subact, nona, iso	Si Thon	St	NE	22
				fl, sili, subact, nona, iso	Chaiya	Cya	S	45
				fsi, mixed, superact, nona, iso	Lom Sak	La	N	15
				f, mixed, nona, iso	Samut Prakan	Sm	C	3
				csk, mixed, act, nona, iso	Thung Khai	Tuk	S	25
				vf, mixed, semiact, nona, iso	Bang Mun Nak	Ban	N	4
				f, mixed, superact, nona, iso	Tha Phon	Tn	N	7
				Aeric (Plinthic)	f, mixed, semiact, a, iso	Chumsaeng	Cs	4
Ustepts	Tropaquepts	Dystrustepts	Mollic	fsi, mixed, superact, nona, iso	Phan Thong	Ptg	S	16
				fsi, mixed, semiact, a, iso	Tak Bai	Ta	S	16
				cosil, mixed, superact, nona, iso	Ko Yai	Koy	S	34
				col, mixed, act, iso	Chumphon Buri	Chp	NE	38
					Don Chedi	Dc	C	38

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

อันดับ	อันดับข่าย	กลุ่มใหญ่	กลุ่มย่อย	วงศ์	ชุดดิน	ภาค	กลุ่มชุดดิน
Inceptisols	Ustepts	Haplustrepts	Aquic (Fluventic)	fl, mixed, act, nona, iso	Sapphaya	Sa	C 21
	Udepts	Eutrudepts	Fluvaquentic	col/c, sili/kao, subact, nona, iso	Makham	Mak	S 10
Entisols	Aquents	Sulfaquents	Fluventic	f, mixed, superact, iso	Bung Chanang	Bng	S 52
			Haplic	f, mixed, superact, a, iso	Chian Yai	Cyi	S 34
			Typic	fsi, mixed, superact, a, iso	Takua Thung	Tkt	S 13
		Hydraquents	f, mixed, a, iso	Bang Pakong	Bpg	C	13
			Sodic	f, smec, nona, iso	Tha Chin	Tc	C 12
Psamments	Quartzipsamments	Psammaquents	Humaqueptic	sili, iso	Sai Khao	Sak	S 23
			Typic	sili, iso	Wan Priang	Wp	S 23
			Oxyaquaic	coated, iso	Ban Bung	Bbg	S 24
			Lamellic Ustic	coated, iso	Dong Takhian	Dt	C 43
			Ustic	coated, iso	Dan Khun Thot	Dk	NE 44
		Ustipsamments	Typic	coated, iso	Bacho	Bc	S 42
					Hua Hin	Hh	S 17
					Lang Suan	Lan	S 43
					Mai Khao	Mik	S 43
					Phattaya	Py	S 43
Fluvents	Ustifluvents	Oxyaquaic			Sattahip	Sh	S 43
					Rayong	Ry	S 43
		Typic	s, sili, coated, iso	Chan Tuk	Cu	NE	44
Orthents	Udifuluvents	Oxyaquaic	col, mixed, superact, nona, iso	Chiang Mai	Cm	N	38
		Typic	col, mixed, act, cal, iso	Tha Muang	Tm	C	38
Orthents	Udorthents	Typic	col, mixed, superact, a, iso	Tha Khun	Tkn	S	32
		Lithic	lск, mixed, semiact, a, iso	Ranong	Rg	S	51
		Typic	lск, mixed, semiact, a, shallow, iso	Huai Yot	Ho	S	51

1. การจำแนกดิน

การจำแนกดินในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงการจำแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1975 เพื่อให้เป็นระบบการจำแนกดินสากล ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา จนถึงล่าสุดเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 9 ปี ค.ศ. 2003 (Soil Survey Staff, 2003) กรมพัฒนาที่ดินได้นำระบบนี้มาใช้จำแนกดินของประเทศไทยตั้งแต่ปีแรกที่ระบบนี้เริ่มพัฒนาขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบการจำแนกดินของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของระบบตลอดเวลาเข่นกัน

ระบบอนุกรมวิธานดินมีขั้นการจำแนกดิน 6 ชั้นดังนี้

ชั้นสูง (Higher category)	แบ่งเป็น อันดับ (Order)	ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 อันดับ
	อันดับย่อย (Suborder)	ปัจจุบันมีทั้งหมด 64 อันดับย่อย
	กลุ่มใหญ่ (Great Group)	
	กลุ่มย่อย (Subgroup)	
ชั้นต่ำ (Lower category)	แบ่งเป็น วงศ์ (Family)	
		ชุด (Series)

ตัวอย่างการจำแนก

อันดับ	Alfisols
อันดับย่อย	Ustalfs
กลุ่มใหญ่	Haplustalfs
กลุ่มย่อย	Typic Haplustalfs
วงศ์	Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs
ชุด	Wang Saphung series (ชุดดินวังสะพุง)

2. การจัดเรียงชั้นดิน

การจัดเรียงชั้นดินเป็นการแสดงชั้นกำเนิดดิน (Genetic horizons) ต่างๆ ที่พบในหน้าตัดของดิน เรียงลำดับตั้งแต่ดินบนจนถึงดินล่างหรือถึงชั้นหินพื้น ชุดดินต่างๆ อาจจะมีลักษณะของการจัดเรียงชั้นดินที่แตกต่างหรือเหมือนกันก็ได้ แต่ชุดดินที่มีการจัดเรียงชั้นดินเหมือนกันจะมีลักษณะและสมบัติอื่นๆ บางประการที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ของชื่อชั้นดินต่างๆ ที่แสดงไว้อาศัยบรรทัดฐานของการให้ชื่อตามระบบของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอธิบายไว้ในบทที่ 18 (Designations for Horizons and Layers) ของ Keys to Soil Taxonomy 9th edition (Soil Survey Staff, 2003)

สำหรับชั้นดินต่างๆ ที่ให้สัญลักษณ์นั้นจะมีการทำหนดลักษณะและสมบัติเฉพาะไว้ ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับการทำกำเนิด ซึ่งเรียกว่าชั้นกำเนิดดิน (genetic horizons)

การให้ชื่อชั้นดินจะใช้สัญลักษณ์ 3 ตัวคือ

1. อักชรตัวพิมพ์ใหญ่ คือ O A B C และ R จะใช้แทนชั้นดินหลัก (Master horizons and layers)
2. อักชรตัวพิมพ์เล็ก ได้แก่ a c g p v ใช้เติมต่อท้ายอักชรตัวใหญ่ ที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของชั้นดินหลัก ตัวอย่างเช่น Ap หรือ Bg เป็นต้น
3. ตัวเลขอารบิก ได้แก่ 1 2 3 ใช้ทั้งเติมข้างหน้าหรือต่อท้ายชั้นดิน โดย
 - ถ้าต่อท้าย จะใช้ในการแบ่งชั้นดินนั้นๆ ออกเป็นชั้นดินย่อย เช่น แบ่งชั้นดิน Ap ออกเป็น Ap1 Ap2
 - ถ้าเติมข้างหน้า แสดงว่าชั้นดินนั้นๆ ไม่สัมพันธ์กับชั้นดินที่มีตัวเลขต่างกัน เช่น Ap-Bt-2C

3. ชั้นดินหลัก (Master Horizons and Layers)

O horizons หรือ layers: เป็นชั้นที่มีอินทรีย์สารอยู่มาก

A horizons: เป็นชั้นดินแร่ อาจเกิดที่ผิวดินหรือใต้ชั้น O และไม่มีชิ้นส่วนของหินหรือมีน้อยมาก และจะต้องมีลักษณะที่แสดงถึง

1. มีภาวะสมของอิฐมัสโดยคลุกเคล้ากับอนุภาคต่างๆ ของดินแร่ และไม่มีลักษณะของชั้นดิน E หรือ B เด่นชัด
2. มีสมบัติที่เป็นผลมาจากการเพาะปลูก หรือการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

E horizons: เป็นชั้นดินแร่ที่มีภาวะสูญเสียของซิลิกา ดินเหนียว เหล็ก อะลูมินัม หรืออินทรีย์วัตถุ โดยมีอนุภาคทราย และทรายแบ่งลงเหลืออยู่ ชั้นดินนี้ต้องไม่มีชิ้นส่วนของหินหรือมีน้อยมาก

B horizons: เป็นชั้นดินที่อยู่ใต้ชั้น A E หรือชั้น O ไม่มีชิ้นส่วนของหินหรือมีน้อยมาก และต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่แสดงถึง

1. การสะสมของอนุภาคดินเหนียว เหล็ก อะลูมินัม อิฐมัส คาร์บอเนต ยิปซัม หรือซิลิกา
2. มีภาวะสูญเสียของคาร์บอเนต
3. มีภาวะสมของเหล็ก-อะลูมินัมออกไซด์ หรือ เซสควิออกไซด์ (sesquioxides)
4. มีการเคลื่อนของเซสควิออกไซด์ (sesquioxides) ซึ่งทำให้ดินในชั้นนี้มีค่าสี (value) ต่ำกว่า มีค่ารงค์ (chroma) สูงกว่า และสีสัน (hue) แรงกว่าชั้นดินที่อยู่ข้างบนและข้างล่าง
5. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดินได้แก่ การเกิดแร่ดินเหนียวซิลิกेट (silicate clay) การปลดปล่อยออกไซด์ การเกิดโครงสร้างแบบก้อนกลม (granular blocky) ก้อนเหลี่ยม (blocky) หรือแท่งหัวเหลี่ยม (prismatic)
6. มีความเปร่า
7. มีสภาพขังน้ำ และเกิดการสูญเสียออกซิเจนอย่างรุนแรงจนเกิดสีเทา

C horizons or layers: เป็นชั้นที่มีกระบวนการทางปูพิเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และไม่มีสมบัติหรือลักษณะของชั้น O A E หรือ B วัสดุของชั้น C อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับดินที่เกิดขึ้นตอนบนเดียวกันได้

R layers: หมายถึง ชั้นหินแข็ง ได้แก่ หินแกรนิต บะซอลท์ ควอตซ์ไซด์ หินปูนแข็ง หินทราย เป็นต้น

4. ความลาดชันของพื้นที่

ความลาดชันของพื้นที่ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่เปลี่ยนไปจากแนวราบหรือแนวระนาบ มีหน่วยวัดเป็นองศาของมุมเอียง ร้อยละของความเอียง หรือสัดส่วนของระยะในแนวตั้งกับแนวอน สำหรับหน่วยที่ใช้ในการศึกษาดิน สำราจดินและทำแผนที่ดินของประเทศไทยเป็นร้อยละของความเอียงหรือเปอร์เซ็นต์

สภาพพื้นที่ในเอกสารนี้จะอธิบายถึงความลาดชันเชิงชั้น (complex slope) ซึ่งแสดงถึงภาพรวมของพื้นที่ สำหรับการแบ่งชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทยได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน โดยแบ่งออกเป็น 8 ชั้นดังนี้

<u>ความลาดชัน (%)</u>	<u>ความลาดชันเชิงชั้น</u>
0-2	ราบเรียบถึงค่อนข้างราบรื่น
2-5	ลูกคลื่นลดลงลาดเล็กน้อย
5-12	ลูกคลื่นลดลงลาด
12-20	ลูกคลื่นลดลงชัน
20-35	เนินเขา
35-50	สูงชัน
50-75	สูงชันมาก
ชันกว่า 75	สูงชันมากที่สุด

5. ความลึกของดิน

ความลึกของดินที่ใช้อธิบายถึงลักษณะและสมบัติของดินหมายถึงความหนาของดินจากชั้นผิวดินถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการซ่อนไขของรากพืช ได้แก่ แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นอ่อน ชั้นเข็มแข็งของอินทรีย์ตุ่นและตะกอนหินอ่อน หรือชั้นดานอินทรีย์ แนวสัมผัสของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ รวมถึงชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และสารมวลพอกต่างๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือมากกว่า ในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

ความลึกของดินแบ่งออกเป็น 5 ชั้นดังนี้

ความลึก (ซม.)	ความหมาย
0-25	ตื้นมาก
25-50	ตื้น
50-100	ลึกปานกลาง
100-150	ลึก
ลึกกว่า 150	ลึกมาก

ความหมายของความลึกของดินในที่นี้อาจแตกต่างจากความหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการจำแนกดินบ้าง โดยเฉพาะดินที่มีชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และสารมวลพอกต่างๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยการจำแนกดินจะไม่นำชั้นนี้มาพิจารณา และถือว่าเป็นดินลึกมาก เนื่องจากกระบวนการเกิดดินยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงชั้นดินตอนล่าง

6. การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

กรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูง ซึ่งจะใช้วิธีประเมินจากค่าวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน 5 ประการได้แก่ อินทรีย์วัตถุ ความจุการแลกเปลี่ยนแคนต์ไอโอน ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการวิเคราะห์ดินจะใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานตาม Soil Survey Laboratory Method Manual (USDA, NRCS, 1996) ซึ่งอธิบายโดยย่อดังนี้

1. ค่าอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter หรือ OM) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ คำนวนได้จากการบันทึกค่าอินทรีย์คาร์บอนโดยคูณด้วยค่า 1.724 สำหรับการวิเคราะห์หาค่าอินทรีย์คาร์บอนใช้วิธีของ Walkley และ Black Titration

2. ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคนต์ไอโอน (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) มีหน่วยเป็นเซนติโมลต่อกิโลกรัม (cmol/kg) การวิเคราะห์หาค่า CEC จะใช้น้ำยาสกัดแอมโมเนียมอะซิตेटที่เป็นกลาง (NH_4OAc pH 7.0)

3. ค่าความอิ่มตัวเบส (Base Saturation หรือ BS) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ คำนวนได้จากการวิเคราะห์ของเบสพวง แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งวิเคราะห์ดินโดยใช้น้ำยาสกัดแอมโมเนียมอะซิตेटที่เป็นกลาง (NH_4OAc pH 7.0)

4. ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) มีหน่วยเป็น mg/kg (หรือ ppm) วิเคราะห์โดยใช้วิธี Bray II

5. ค่าโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available potassium) มีหน่วยเป็น mg/kg (หรือ ppm) ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้น้ำยาสกัดแอมโมเนียมอะซิตेटที่เป็นกลาง (NH_4OAc pH 7.0)

ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์และการคำนวณของแต่ละสมบัติดินจะนำมาให้ค่าตัวเลขตามช่วงค่าที่แบ่งไว้เป็น 3 ระดับ โดยช่วงค่าต่ำจะให้เลข 1 ช่วงค่าปานกลางจะให้เลข 2 และช่วงค่าสูงจะให้เลข 3 ดังนี้

ระดับ	อินทรีย์วัตถุ (%)	ความฉุกเฉียบเปลี่ยน แอดไอกอน (cmol/kg)	ความอิ่มตัว เบส (%)	ฟอสฟอรัสที่ เป็นประizable (mg/kg)	โปเตสเซียมที่ เป็นประizable (mg/kg)
ต่ำ	น้อยกว่า 1.5 (1)	น้อยกว่า 10 (1)	น้อยกว่า 35 (1)	น้อยกว่า 10 (1)	น้อยกว่า 60 (1)
ปานกลาง	1.5-3.5 (2)	10-20 (2)	35-75 (2)	10-25 (2)	60-90 (2)
สูง	มากกว่า 3.5 (3)	มากกว่า 20 (3)	มากกว่า 75 (3)	มากกว่า 25 (3)	มากกว่า 90 (3)

ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน จะนำตัวเลขของช่วงค่าของสมบัติดินทั้ง 5 ประการมารวมกัน แล้วประเมินตามเกณฑ์ดังนี้

<u>ระดับความอุดมสมบูรณ์</u>	<u>ผลรวมตัวเลข</u>
ต่ำ	5-7
ปานกลาง	8-12
สูง	13-15

ผู้ดำเนินการ

ที่ปรึกษา

นายอรรถ สมร่าง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการและภารกิจประจำเดือนและวางแผนการใช้ที่ดิน

นายชุมพล ลิลิตธรรม	(ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)	ประธานคณะกรรมการ
นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู	(หัวหน้าส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)	คณะกรรมการ
นางจรรยา อินทรัชี	(หัวหน้าส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ)	คณะกรรมการ
นายเจตนา ล่อใจ	(หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1)	คณะกรรมการ
นายอุดล พร้อมจรรยาภุกุล	(หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2)	คณะกรรมการ
นายอิสรา อนันต์รักษ์พงศธร	(หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3)	คณะกรรมการ
นายสหัสชัย คงทน	(หัวหน้าส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน)	คณะกรรมการ
นางวัลยรัตน์ วรรณปิยรัตน์	(หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1)	คณะกรรมการ
นายบุญรักษา พัฒนกนก	(หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2)	คณะกรรมการ
นายคิริวัฒน์ สิงห์คิริ	(หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจที่ดิน)	คณะกรรมการ
นายนาวิก ดาวาพงษ์	(หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1)	คณะกรรมการ
นายวีรชัย กาญจนลักษณ์	(หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2)	คณะกรรมการ
นายอีรยาภรณ์ จิตต์จำรงค์	(หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3)	คณะกรรมการ
นายภูมิตร วิวัฒน์วงศ์วานิ		คณะกรรมการ
นายอนันธ์ โพธิจันทร์		คณะกรรมการและเลขานุการ
นางผลการฟ้า ศรีจารัสสุวรรณ		คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุมิตรา วัฒนา		คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เรียบร้อยจัดทำเอกสารต้นร่าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)

นายภูมิตร วิวัฒน์วงศ์วานิ

นายณรงค์ ตระสุวรรณ

ผู้ออกแบบและจัดรูปเล่ม

นางสาวนฤกมาล จันทร์จิราภูมิกุล

นายพัลลภ วงศ์เจริญไทย

นายนันนาท พัฒนาวงศ์สุนทร